

MATÉRIAUX POUR LA FAUNE COLÉOPTÉRIQUE MALGACHE

par M. L. Fairmaire.

18^e NOTE

CARABIDÆ

Lebia indigacea. — Long. 5 1/2 mill. — Ovata, paulo convexa, nigro cœrulescens, nitida, prothorace, macula elytrorum scapulari, abdomine pedibusque aurantiaco-rufis, tibiis apice infuscatis; capite ad oculos foveola minuta signato, his globosis, antennis fuscis, articulis 2 primis rufis; prothorace brevissimo, longitudine duplo latiore, lateribus ante basin recte angulatis, constrictis dilutioribus, dorso convexo, ad angulos fortiter impresso; elytris ovatis, medio leviter ampliatis, fortiter striatis, striis lævibus, intervallis convexis, apice truncatulis, extus rotundatis. — Soalala (*H. Perrier*).

Ressemble assez à la *L. acutangula* Fairm., mais plus grande, bien plus large, le corselet tout à fait transversal et les élytres larges, profondément striées, n'ayant qu'une tache humérale.

Dromius cribricollis. — Long. 6 1/2 mill. — Ressemble extrêmement au *dissimilis* Kl., mais un peu plus grand, avec le corselet plus fortement rétréci avant la base, plus large en avant, très ponctué, surtout à la base et en avant, les bords moins relevés à la base; les stries des élytres sont plus fortement ponctuées, les intervalles plus convexes et l'extrémité est plus fortement tronquée avec les angles plus marqués. — Ankarahitra (*H. Perrier*); un seul individu.

SCARABÆIDÆ

Liatongus basicornis. — Long. 9 mill. — Ovatus, fusco-brunneus, nitidus, vage cœrulescens, elytris nigris, fasciis 2 transversis, valde dentatis, pallide flavidis ornatis 8 prothoracis parte antica et capite viridibus, nitidis; capite medio lævis lateribus ruguloso-punctato, antice transversim biplicata, plica apicali majore, fronte laminato-elevata, utrinque anguloso-producta, medio cornu angusto, vix arcuato, obtuso armata; prothorace transverso, convexo, lateribus rotundato, punctulato, medio subtiliter sulcatulo, postice profundius, utrinque sulco obliquo signato; scutello brevi, transverso, elytris subtilissime striatulis, ad scutellum

depressis; pygidio convexiusculo, lateribus anguste depresso. — Diégo-Suarez (*D^r Sicard*).

Ressemble assez au *splendidicollis* Fairm., mais outre la différence de coloration du corselet et sa sculpture, l'armature de la tête est bien différente, la corne est assez grêle, nullement élargie au sommet et les angles de la base sont fortement saillants en dehors; la coloration des élytres est très pâle avec un dessin presque identique.

Empecta latipennis. — Long. 18 mill. — Ovata, postice dilatata, sat convexa, piceo-fuscula, vix nitidula, subtilissime cinerascens; capite brevi, antice levissime sinuato, rugoso-punctato; prothorace transverso, antice valde angustato, dorso dense rugosulo-punctato, angulis anticis acutiusculis, posticis rectis; scutello obtuso, parce punctato; elytris brevibus, postice dilatatis, dense parum fortiter punctatis, subrugosulis, sutura convexiuscula, læviore; pygidio dense punctato, subtiliter cinereo-puberulo; subtus cum pedibus magis fusca, valde nitida, pectore dense, abdomine subtiliter griseo-villosa, segmentis ventralibus haud connatis, pedibus validis, tibiis antice fortiter bidentatis. — Soalala (*H. Perrier*).

Ressemble à l'*E. obesa* Fairm., mais plus petite, plus élargie en arrière, avec les élytres plus courtes, plus finement ponctuées et les angles antérieurs du corselet plus pointus.

Emphania subcostata. — Long. 7 mill. — Forme et coloration de l'*E. metallica* Bl., mais d'un vert métallique un peu plus bleuâtre avec une faible teinte cuivreuse sur la suture, ainsi que sur la partie antérieure du corselet; la grande différence est que les élytres sont nettement striées, les stries lisses, avec les intervalles un peu convexes; le corselet n'est pas aussi large à la base que les élytres et se rétrécit en avant, les côtes étant arrondies à la base et la surface est plus nettement ponctuée; l'écusson est semblable; les tibias antérieurs sont fortement bidentés, les tarses postérieurs sont très longs et très grêles. — Madagascar; coll. du Muséum; un seul individu.

G. CLYPEARIA Fairm., Ann. Soc. Fr., 1903, 194.

Ce nom de genre a été déjà employé pour un sous-genre du g. *Polybia* par Saussure, ainsi que notre collègue, M. Régnier, a bien voulu me le signaler. Je le remplace par le nom de *Clypeasta*.

Adoretus ampliatus. — Long. 9 à 10 mill. — Oblongo-ovalus, postice ampliatus, piceo-fuscus, nitidus; capite punctato, rugosulo, antice leviter concavo, epistomate interdum rufescente,

labro sat brevi, parum angustato; prothorace brevi, antice angustato, punctato, rugosulo, angulis posticis obtusiusculis; scutello parum punctato; elytris ovatis, postice ampliatis, ad humeros impressis; dorso dente punctatis, sutura et utrinque lineolis 3 parum elevatis, callis posticis sat convexis, lævigatis; pygidio rugosulo; subtus punctulatus, abdomine fortius, pedibus plus minusve rufescentibus, pedibus brevibus, crassiusculis, tibiis anticis fortiter bidentatis. — Diégo-Suarez; ma collection.

Ressemble à l'*insularis* Fairm., des Seychelles, mais plus large, plus dilaté en arrière, avec la tête et le corselet fortement ponctués, ruguleux, la première un peu concave en avant, et les élytres assez largement impressionnées près des épaules.

Adoretus rugosohirtus. — Long. 13 à 15 mill. — Ressemble beaucoup à l'*hystrix*, mais un peu plus élargi au milieu, avec la tête très ponctuée, le corselet et les élytres ruguleusement ponctués, ces dernières ayant une double vestiture, d'abord de petits poils fins grisâtres, médiocrement serrés, puis de soies blanches raides très écartées, redressées, plus grêles que celles de l'*hystrix*; le corselet a la même forme, mais sa surface est inégale, garnie de gros points, même au milieu; les élytres sont fortement ponctuées entre les rugosités, moins arrondies à l'extrémité, également impressionnées près des épaules; le pygidium est rugueux, de même couleur que tout le corps; les fémurs sont bruns ou roux; les postérieurs inermes avec les tibias droits. — Diégo-Suarez; ma collection.

Je n'ai vu que deux individus de cette espèce, tous deux ♀ ayant les tibias antérieurs tridentés; seraient-ce des ♀ de l'*hystrix*?

PIOCHILIA SCALABRII Fairm., Ann. Soc. Belg., 1896, 336.

Cette Cétonide avait été décrite sur une seule ♀; récemment j'ai reçu de mon ami M. Perrier de la Battrie quelques individus de l'autre sexe qui présentent un caractère assez rare dans le groupe; c'est le développement de la massue antennaire qui est arquée et de moitié plus longue que le funicule; elle est brune en dessus et roussâtre en dessous. L'abdomen est largement impressionné. Le corselet est parfois un peu roussâtre sur les côtés. Enfin, un individu est entièrement noir. Il n'y avait pas un seul individu ♀.

J'ai pu reconnaître, avec ces individus, que le g. *Prochyta* Fairm. (Ann. Fr., 1899, Bull. 77) est identique avec le g. *Piochilia*; le triste état dans lequel se trouvait cet insecte tout à fait déformé m'avait fait méconnaître son identité et même ses affinités. Il doit se placer près des *Heterophana*.

Anochilia subvidua. — Long. 13 mill. — Oblongo-ovata, postice levissime attenuata, tota fusco-cærulescens, sat nitida; capite

lævi, paulo nitidior et magis cœrulescente, antice fortiter emarginato, utrinque fortiter impresso; prothorace parum transverso, fere conico-truncato; elytris parum angustior, antice sat fortiter angustato, lateribus vix arcuatis, dorso lævi, margine postico ad scutellum vix sensim sinuato, angulis posticis valde obtusis; scutello oblongo-triangularo, acuminato; elytris oblongo-ovatis, ad humeros paulo ampliatis, infra fortiter sinuatis, disco fortiter striatis, striis lævibus, intervallis alternatim latioribus et magis convexis, parte marginali transversim strigosula; pygidio fere lævi, apice obsolete biimpresso; subtus cum pedibus concolor et paulo nitidior, pectore lateribus laxè punctato, processu mesosternali breviter producto, obtuso, lævi; pedibus sat gracilibus, tibiis anticis apice breviter bidentatis : ♂. — Diégo-Suarez (*D^r Sicard*).

Anochilia laterivirens. — Long. 11 à 13 mill. — Ressemble extrêmement à la précédente pour la sculpture et la coloration, mais plus courte, plus large, surtout pour le corselet qui est aussi large que les élytres, plus convexe, arrondi sur les côtés qui sont ponctués surtout à la base; la tête et le devant du corselet sont plus bleus, plus brillants; la première est visiblement ponctuée, à peine impressionnée sur les côtés; l'écusson est plus large et bien moins rétréci vers l'extrémité; les élytres sont plus courtes, fortement striées, les stries lisses, les intervalles de même largeur et également convexes; le bord marginal est ponctué et d'un vert bleuâtre; le pygidium est à peu près semblable; le dessous est aussi d'un vert bleuâtre assez brillant, assez densément et finement ponctué; les pattes sont d'un brun foncé; la saillie mésosternale est assez large, un peu élargie et lisse à l'extrémité; le ♂ a une large impression ventrale. — Diégo-Suarez; ma collection.

Coptomia castanoptera. — Long. 15 mill. — Oblonga, parum ovata, piceo-fusca, valde nitida, glabra, elytris castaneo-rufis; capite vix punctulata, utrinque fortiter sulcato, apice profunde emarginato, subtus cum prosterno sat dense, fulvo-piloso; prothorace transverso, elytris angustior, a basi arcuatim angustato, dorso polito; scutello oblongo, a basi apice attenuato, polito; elytris ad humeros lobatis, dein fortiter sinuatis, sat subtiliter lineato-punctulatis, intervallis alternatim paulo convexis, basi cum lineis oblitteratis, costulis 2 disci et vitta marginali vage dilutioribus; pygidio transversim dense ac subtiliter strigosulo; pectore punctato, processu metasternali producto, crasso, lævi, apice declivi, abdomine lævi, pedibus mediocribus, tibiis anticis tridentatis, dente supero obsoleto, tarsis gracilibus. — Diégo-Suarez; ma collection.

Semble être une variété de la *Mauritiana*, mais sa coloration est bien spéciale, les côtes des élytres sont moins marquées, tandis que

les lignes ponctuées sont plus distinctes; enfin, le pygidium est finement striolé au lieu d'être ponctué.

COPTOMIA BONTEMPSI Fairm., Ann. Soc. Belg., 1896, 456.

Cette espèce a été décrite sur un seul individu dont la coloration a changé avec le temps et est devenue presque noire. Depuis, d'autres individus provenant de la même localité, montrent la variation extrême de la coloration chez cet insecte; elle passe en effet d'un beau vert pré brillant au rouge vernissé, presque cuivreux, et au noir foncé. Mais la ponctuation et la vestiture restent les mêmes ainsi que la saillie mésosternale qui s'élargit un peu en spatule à l'extrémité.

Pygora prasinella. — Long. 12 mill. — Oblonga, subparallela, læte viridis, nitidissima, elytris ad humeros et extus paulo cupreis, subtus paulo minus nitida, abdomine vitta media longitudinali et utrinque fasciis transversis albopubescentibus, biseriatis, pectore similiter transversim vittulato, pedibus concoloribus, tibiis intermediis paulo cœrulescentibus, posticis violaceis; capite subtilissime punctulato, utrinque fortiter impresso, margine antico leviter emarginato; prothorace vix transverso, elytrorum basi haud angustiore, antice attenuato, a medio paulo evidentius, dorso lævi, margine basali recta, angulis subrectis; scutello acute triangulari, lævi; elytris had humeros valde dilatatis, dein sat fortiter sinuatis, dorso utrinque fortiter quadristriatis, perparia approximatis, 2 internis lævibus, 2 externis fortiter punctatis; intervallo 2° basi latiore, 3° toto latiore et convexo, margine laterali basi cupreo et transversim strigoso, intervallo suturali paulo convexo, basi et apice angustato; pectore lateribus punctulatis, femoribus et coxis anticis subtus albo pilosulis, tibiis anticis bidentatis. — Diégo-Suarez (*D^r Sicard*).

Cette élégante espèce est facile à reconnaître par sa forme étroite, sa coloration d'un vert clair, comme vernissée.

PYGORA LUCTIFERA Fairm., Ann. Soc. Belg., 1899, 29.

Cette espèce est encore plus variable que le *P. chamæleon* Fairm. Ayant pu réunir un certain nombre d'individus recueillis tant à Ankarahitra qu'à Soalala par mon ami M. H. Perrier, je puis rectifier les descriptions de deux espèces.

Var. A. Dessus du corps entièrement noir, un petit trait ou point blanc sur le disque de chaque élytre et quelques points blancs au bord apical. — Type.

Var. B. Élytres entièrement noires, sauf les taches apicales. — *Nigrina* Fairm.

Var. C. Élytres comme dans la variété A, mais ayant une tache

d'un rouge obscur sur la base du disque. — *P. elegantula* Fairm., Ann. Fr., 1901, 154.

Var. *D.* Même coloration, mais corselet rougeâtre. — *P. ruficollis* Fairm., Ann. Soc. Fr., 1901, 154.

Euchilia laxecostata. — Long. 13 mill. — Ressemble à la *protensa*, pour la forme et la coloration, mais plus petite, un peu plus étroite, et comme elle très peu rétrécie en arrière; la tête est ponctuée en avant, ayant de chaque côté une impression peu profonde qui s'élargit à la base près de l'œil; le chaperon est largement échancré; le corselet est semblable, à peine moins large; les élytres ont la suture très saillante, et, de chaque côté, deux côtes, la 1^{re} un peu interrompue, la 2^e courte; les intervalles sont larges, le 1^{er} avec quelques points un peu serrés; le pygidium est presque lisse avec quelques fines rides à l'extrémité; les pattes sont concolores, les tibias antérieurs tridentés. — Diégo-Suarez; ma collection.

Pantolia subcostata Fairm. ressemble singulièrement à cette espèce, mais la forme de la tête et du chaperon ne permettent pas de classer cette espèce près des *Euchilia*.

Euchilia saturata. — Long. 16 mill. — Forme de *sulcata*, mais plus petite, légèrement convexe, d'un bleu très foncé ou faiblement verdâtre; la tête est plus fortement impressionnée et ponctuée sur les côtés, le chaperon est plus largement échancré; le corselet a la même forme, un peu plus arrondi sur les côtés; les élytres ont des stries bien marquées, presque jusqu'à l'extrémité, avec les intervalles un peu convexes, égaux, alternativement plus relevés, surtout à l'extrémité, notamment la saturale; l'extrémité de l'abdomen est noire, le pygidium lisse; les pattes, sauf les fémurs, sont d'un brun foncé. — Ampasimena (*Cotta*); ma collection.

Euchilia protensa. — Long. 13 mill. — Ressemble aussi à *sulcata*, mais plus petite, plus étroite, de même coloration; la tête est bien moins échancrée en avant; le corselet est semblable; les élytres paraissent un peu plus fortement striées; les intervalles sont alternativement plus larges et assez convexes; le pygidium a quelques points râpeux écartés et deux faibles impressions longitudinales; les pattes sont noires, sauf les fémurs, les tibias antérieurs assez fortement tridentés. — Diégo-Suarez; ma collection.

Euchilia externecostata. — Long. 16 à 17 mill. — Forme de la *sulcata* Ol., mais plus petite, d'un vert moins franc, ayant parfois un reflet doré sur les élytres ou une teinte bleuâtre; les élytres ont aussi des stries plus ou moins foncées, mais pas noires, abrégées aussi en arrière, sauf la saturale qui est entière; les deux

externes sont très rapprochées l'une de l'autre; le bord externe est très convexe, formant un bourrelet longitudinal; le corselet a la même forme; la tête est bien plus fortement impressionnée de chaque côté et très ponctuée en avant; le pygidium a la même forme, mais est marqué, vers l'extrémité, de gros points noirs écartés; les tibias antérieurs sont assez faiblement tridentés. — Madagascar; ma collection.

BUPRESTIDÆ

Chalcophoropsis Rothschildi Gahan. — Ann. Mag. N. Hist., 1893, 224. — Long. 37 mill. — Oblongo-elongatus, postice attenuatus, modice convexus, capite prothoraceque læte cœrulescenti metallicis, hoc utrinque late impresso, dense pallido-puberulo et plaga subovata polita atro-cœrulescente utrinque signato, elytris dilute castaneo-metallicis, apice paulo obscurius, maculis minutis numerosis dilute cœruleo-squamosis impressis, subtus cœrulescens, cupreolo tinctus; pedibus cœrulescentibus; capite fortiter rugato, clypeo valde sinuato, antennis haud serratis, prothoracis basin vix attingentibus, infuscatis, articulis 2 primis cœrulescenti-metallicis; prothorace vix transverso, elytris vix angustiore, antice leviter attenuato, valde rugoso, rugis piceo-metallicis, basi utrinque leviter sinuato et striga nigro-velutina impresso, angulis acutiusculis; elytris elongatis, postice attenuatis, ante apicem parce denticulatis, dorso utrinque costulis 4 parum lævibus signatis, 2 primis apice obsoletis, 3^a brevior, 4^a brevissima, intervallis rugosis et maculis numerosis impressis, sutura parum elevata, angulo suturali breviter dentato; subtus dense impresso-rugoso, impressionibus pube pallido-cœrulescenti impletis, abdomine magis cupreolo, processu intercoxali paulo bicostulato, pedibus similiter rugosis, femoribus anticis sat clavatis, magis cyaneis. — Région de l'Androy, Imanombor (*capitaine Vacher*); collection du Muséum.

Cette description est faite d'après un exemplaire beaucoup plus petit que le type qui atteint 48 millimètres. Ce superbe insecte s'éloigne assez des *Chalcophoropsis*, et Kerremans, dans son *Genera des Buprestides*, en a formé un nouveau genre, sous le nom de *Madecassia* (Fairm., Ann. Ent. Fr., 1868, 760), et l'a figuré pl. I, fig. 10. Malheureusement ce nom est déjà employé pour un genre de Carabiques, *Madecassa*, et je propose de le changer en celui de *Lampropepla*.

Lampropepla ophthalmica. — Long. 38 mill. — Oblonga, modice convexa, postice levissime ampliata, supra nigro-fusca, vage cœrulescens, maculis numerosis pube griseo-aurosa impressis;

capite sat minuto, impressa, rugosulo, squamulis aureis minutis sparsuto, clypeo emarginato, labro rufo, antennis fuscis sat elongatis, obtuse serratis; prothorace longitudine vix latiore, a medio antice arcuatim angustato, sat dense punctato, medio longitudinaliter canaliculato, antice utrinque plaga rotunda nigro-cœrulea convexa, annulo viridi et aureosquamuloso circumdata ornato, angulis anticis rectis; scutello minutissimo, fusco, lævi; elytris oblongis, post medium leviter ampliatis, apice angustatis, angulo suturali breviter dentato, dorso sutura et utrinque costulis 2 elevatis, 3^a externa vix distinguenda, intervallis inæqualibus, impressionibus numerosis pubescentibus ornatis, margine externo apice virescenti et brevissimo trispinosulo, subtus cum pedibus æneo-virescens, valde rugoso, rugis politis, plus minusve æneo-aurosis, segmento ventrali ultimo simili, haud plagulato, processu intercoxali leviter concavo, lateribus haud carinato, processu prosternali postice paulo acuminato, valde rugoso-punctato, medio paulo impresso. — Behara, région de l'Androy (*Decorse*); un seul individu; coll. du Muséum.

Ressemble assez au précédent, mais bien moins brillant, presque sombre avec des impressions larges mais peu profondes sur les élytres; le corselet est plus large, plus court; les élytres sont plus larges, plus dilatées et moins atténuées en arrière; les yeux du corselet sont plus petits et placés plus en avant.

Polybothris pulchriventris. — Long. 22 mill. — Forme et coloration du *P. multiguttata* Waterh., mais plus étroit et d'une teinte bronzée plus sombre, plus mate, surtout sur les côtés; le corselet a la même forme, mais il est largement canaliculé au milieu, avec les côtés plus rugueux, mélangés de quelques empâtements cuivreux; sa coloration est très brillante; les élytres, au contraire, sont presque mates, à stries régulières, fortement ponctuées, les intervalles un peu tectiformes vers la suture, effacés sur la partie discoïdale et remplacés par des lignes de très gros points, mélangées de rugosités plus marquées à la base et à l'extrémité; il n'y a aucune impression sur les intervalles; la partie marginale un peu olivâtre, grossièrement mais peu densément ponctuée, l'extrémité non comprimée, obliquement obtuse, à peine pubescente, l'angle interne très effacé; le dessous est d'un vert métallique très brillant mélangé d'un cuivreux purpurin; la moitié apicale du dernier segment est très lisse, violacée; la partie foliacée des élytres est d'un bleu faiblement verdâtre; les pattes sont fortement ponctuées, d'un vert métallique avec les tibias bleuâtres. — Diégo-Suarez; donné par notre collègue, le capitaine Xamheu.

Polybothris pygidialis. — Long. 23 mill. — Forme du *pyropyga* Coq., mais plus petit et d'une coloration plus bronzée, moins terne, marqué sur les élytres de nombreuses taches petites, métalliques, plus ou moins déprimées, plus nombreuses et plus marquées sur les côtés, et sur chacune deux impressions médiocrement grandes, garnies de pubescence pâle, la 1^{re} marginale, après l'épaule, l'autre plus discoïdale avant l'extrémité; le corselet est plus foncé, plus uni sur le disque avec un faible canal médian; les côtés sont plus inégaux, impressionnés avec une squamosité rubiginieuse; les points du disque sont métalliques; les bords-latéraux sont presque parallèles, s'arrondissant seulement en avant; les élytres ont la même forme, mais les stries sont plus fines, les intervalles moins convexes, plus unis, n'ayant que de faibles impressions; l'extrémité est tronquée, pubescente, avec l'angle externe saillant; le dessous, au lieu d'être cuivreux éclatant, est, avec les pattes, d'un bronzé médiocrement brillant, moins fortement rugueux, avec le segment anal plissé et un peu sillonné au milieu. — Madagascar; ma collection.

COMPSOGLYPHA n. g.

Ce nouveau genre de Buprestide se rapproche plutôt des *Psiloptera* que des *Polybothris* : il diffère des deux par les épipleures qui sont à peine visibles à la base et par les deux premiers segments ventraux dont la suture est à peine indiquée; le corselet est tellement sculpté, même sur les côtés, que le bord marginal a disparu; son bord postérieur est fortement sinué de chaque côté, formant presque un lobe tronqué vis-à-vis de l'écusson; celui-ci est cordiforme à la base, puis fortement rétréci et acuminé; les élytres, fortement tuberculées aux épaules, laissent à découvert les méso- et métapleures et, plus étroitement, les côtés de l'abdomen; la base de ce dernier est faiblement impressionnée au milieu et le dernier segment est presque tronqué, avec une petite impression au milieu du bord apical qui le fait paraître un peu sinué; les pattes sont courtes et grêles.

Le corps est allongé, atténué en arrière, et les fortes fossettes dont il est couvert, même sur la tête, jointes à sa coloration métallique, rendent cet insecte fort curieux et intéressant.

Compsoglypha Perrieri. — Long. 13 mill. — Oblonga, postice attenuata, modice convexa, fusco-metallescens, nitida, sulcis et foveis cupreo-aurosis impressa, foveis subtiliter granulosi, elytris abdomineque punctulis albo-pubescentibus laxè impressis; capite late ac profunde canaliculato, lateribus inæqualibus, oculis magnis,

antennis prothoracis basin haud attingentibus, parum serratis, fusco-cuprascentibus; prothorace transverso, elytris parum angustiore, antice vix attenuato, ante angulos anticos sat abrupte angustato, medio profunde sulcato, utrinque profunde plurifoveato, margine postico utrinque fortiter emarginato; scutello elongato, basi lato, excavato, dein angusto et acutissimo; elytris medio vix sensim ampliatis, dein angustatis, apice subrotundatis, basi utrinque late foveatis, foveis medio carinatis, humeris tuberosis, politis, infuscatis, disco medio undulatum subcostato, utrinque foveolatim impresso, ante apicem tuberculo infuscato, polito signatis, margine externo fere medio late sinuato; subtus dense subtiliter punctata, prosterno lato et late longitudinaliter impresso, abdomine basi longe medio impresso, segmento ultimo apice arcuatim impressiusculo, tarsi obscure cœruleis. — Ambongo (*H. Perrier*).

Chez un 2^e individu, les parties saillantes des élytres sont un peu bleuâtres.

Discoderes polychrous. — Long. 5 mill. — Oblongus, postice leviter ampliatus, nigro-fuscus, paulo ænescens, capite antice rufo-cupreo, prothorace maculis rufo-cupreis, punctis albo-pubescentibus intermixtis sparsulo, elytris plaga basali transversa, plaga magna mediana, extus prolongata et macula ante apicali rufo-cupreis, lineis albo-pubescentibus marginatis et maculis minutis similibus intermixtis; capite summo fortiter excavato, antennis brevibus, serratis, fusco-ænescentibus; prothorace brevi, lateribus sat rotundato, medio elevato, fere bituberoso, antice et basi transversim impresso, basi bisinuato; scutello triangulari, acuto; elytris ante medium leviter angustatis, postice sat ampliatis, apice obtuse rotundatis, dorso densissime subtiliter rugosulis, sutura postice paulo elevata; subtus pectore albido fasciato, abdomine rufo-cupreo, lateribus albido lineolato. — Ambongo (*H. Perrier*).

Ressemble assez au *D. Perrieri* Fairm. (Ann. Belg., 1900, 241) pour la forme et la sculpture, notamment pour la tête et le corselet, mais il est plus petit, plus élargi en arrière et la coloration est bien différente.

Discoderes cavifrons. — Long. 5 1/2 mill. — Modice elongatus, medio levissime angustatus, fusco-cœruleus, nitidus, elytris medio et apice aurosis, et punctis cum lineolis transversis albo-pubescentibus ornatis, prothorace piceo-vinoso velutino, basi et lateribus nitido cœrulescenti-auroso, scutello auroso; capite prothorace vix angustiore, late et fortiter excavato, strigoso-rugosulo, vinoso-velutino, summo cœruleo, antice lineola albo-pubescente interrupta signato, antennis prothoracem vix attingentibus, latis,

dentatis, apicem versus angustioribus, fusco-cœrulescentibus; prothorace transverso, antice angustato, dense strigosulo-rugoso, basi medio potius punctato, utrinque basi sat fortiter impresso; scutello acuto, punctulato; elytris oblongis, medio levissime angustatis, dense subtiliter squamulosis et transversim, ad latera præsertim strigosulis, basi late ac fortiter impressis, postice oblonge impressis, fere medio ad suturam puncto impresso, apice sat abrupte declivibus; subtus cum pedibus cœrulescens, abdomine medio auroso et utrinque vittis 2 albopubescentibus transversim ornat. — Soalala (*H. Perrier*).

Ressemble au *D. Perrieri* Fairm., mais la tête est plus largement et plus profondément concave, le corselet est très différent et la coloration est aussi assez différente.

ELATERIDÆ

Cephalodendron Sicardi. — Long. 19 mill. — Elongatum, modice convexum, nigrum, vage cœrulescens, capite prothoraceque parum nitidulis, elytris nitide auroso-æneis; subtus cum pedibus nitidior; capite subtiliter rugosulo-punctato, antice paulo impresso, antennis sat brevibus, prothoracis basin vix attingentibus, articulo 3^e longiore, 5-10 triangularibus, paulo transversis, apice sinuatis et utrinque angulatis, penultimis fortius emarginatis, ultimo simili sed fortius emarginato, bifido; prothorace conico-truncato, densissime subtiliter punctato, angulis posticis oblique productis; scutello æneo, apice truncatulo, punctulato; elytris elongatis, ante apicem paulo angustatis, dorso dense punctatis, costulatis, costulis punctatis, paulo rugosulis; subtus dense subtiliter punctatum, processu prosternali fortius punctato, inter coxas anguloso, mesosterno concavo, femoribus paulo compressis, tarsis parum elongatis, paulo compressis. — Diégo-Suarez (*D^r Sicard*).

Ressemble au *C. virescens* Bonv. pour la forme, mais d'une coloration métallique bien différente et très remarquable dans ce genre; les antennes sont aussi conformées d'une manière toute spéciale.

DIDYMOLOPHUS n. g.

Ce nouveau genre paraît voisin des *Dichelonychus*, bien qu'il n'ait pas les crochets tarsiens fendus à l'extrémité; la tête est légèrement concave en avant, médiocre, avec les yeux assez gros et assez saillants, les mandibules fortement arquées en avant, les palpes manquent; les antennes sont un peu plus courtes que le

corps, doublement pectinées à partir du 3^e article, les branches plus longues que l'article même; le corselet est plus étroit que les élytres, à peine plus large que long, à peine atténué en avant, les angles postérieurs peu obliques, minces, faiblement arqués en dedans; l'écusson est oblong; les élytres sont allongées, un peu rétrécies seulement à l'extrémité qui est obtuse; le prosternum est assez large, le mésosternum nul entre les hanches; les pattes sont médiocrement robustes, les tarses plus longs que les tibias, les articles décroissant un peu, sans lamelles, à crochets petits, simples.

L'insecte, type de ce genre, ressemble plus à certains *Athous* qu'à des *Cratonychus*.

Didymolophus Perrieri. — Long. 10 mill. — Oblongus, modice convexus, sat dilute rufescens, nitidulus; capite sat brevi, prothorace vix angustiore, dense punctato, inter antennas leviter impresso, labro sat magno, fere lævi, mandibulis apice fuscis; prothorace antice leviter attenuato, angulis cum margine antico rotundatis, dorso dense subtiliter punctato, rugosulo, scutello oblongo-ovato, dense punctato; elytris sat fortiter striato-punctatis, striis postice oblitteratis, punctis confusis et paulo rugosulis, margine externo leviter et anguste cœrulescente; subtus cum pedibus concolor, tibiis posterioribus paulo infuscatis. — Soalala (*H. Perrier*).

Cet insecte est remarquable par la double pectination des antennes; il me semble que le *Pyrapractus bipectinicornis* Fleut. (*Ann. Muséum*, 1889, 224) doit rentrer dans ce nouveau genre. Il est plus grand, 14 à 17 mill., d'un brun foncé brillant; les antennes sont pectinées à partir du 4^e article; le 2^e est très petit, la tête concave; le corselet est subquadrangulaire, à ponctuation fine, peu serrée, avec les côtés subbisinués; les angles postérieurs sont légèrement recourbés en dedans.

MALACODERMATA

Luciola xanthochroa. — Long. 8 à 10 mill. — Oblonga, modice convexa, capite nigro, prothorace rufo, elytris rufulo-lutulosus, subtus rufula, abdominis segmentis 2 et 3 fuscis, rufo-maculatis, 3 ultimis dilute rufulis; femoribus rufis, tibiis tarsisque nigris; capite punctato, oculis mediocribus, sat distantibus; prothorace transverso, antice parum angustato, lateribus cum angulis anticis rotundatis, dorso convexo, margine antico depresso, basi paulo arcuatim impresso, angulis sat obtusis; scutello scutiformi;

elytris dense ruguloso-punctulatis, sutura et utrinque lineis 4 leviter elevatis, apice brevissime fumatis, — ♀ major, antennis elongatis. — Soalala (*H. Perrier*).

Facile à reconnaître par sa taille et sa coloration analogue à celle de la *L. fulvago* Fairm., qui est bien plus petite. La *Lampyrus cribricollis* Klug. semble s'en rapprocher beaucoup, mais le corselet a une tache noire triangulaire médiane, il est déprimé au milieu et l'écusson a une ligne noire; les antennes sont très courtes et les fémurs sont bruns à l'extrémité.

Silis nigrifrons. — Long. 5 mill. — Oblongo, elytris planiusculis, fusca, nitidula, capite nigro, antice rufo, prothorace rufo, utrinque macula rufa laterali signato, pedibus rufis, tibiis tarsisque interdum fumatis; capite sat lato, summo subtilissime punctulato, nitido, oculis sat magnis, globosis, antennis parum gracilibus, fuscis, articulo 1^o interdum rufo, ♂ longioribus et tenuioribus; prothorace transverso, elytris angustiore, dorso medio impresso, lateribus ante basin emarginatis, angulis posticis dentiformibus; scutello lato; elytris postice vix sensim ampliatis, dense subtiliter punctato-coriaceis, sutura tenuiter elevata; subtus subtiliter cinereo-pubescent, ano fulvido. — Soalala (*H. Perrier*).

Ressemblerait au *S. aucta* Klug pour l'ensemble de la coloration, mais ce dernier est plus grand, le corselet a en plus une tache noire médiane, la tête est toute noire, sauf les mandibules, le corselet est un peu bituberculé à la base, inégal en dessus, et les pattes sont noires.

Atractocerus madagascariensis Cast., Rev. Silb., IV, 59. — Long. 18 lignes. — Finement granuleux, obscur; antennes d'un brun clair, une bande longitudinale de même couleur sur la partie postérieure de la tête et sur le corselet, celui-ci en carré long; abdomen un peu rougeâtre en dessous; élytres étroites; tarses et jambes postérieurs blanchâtres; ailes courtes, à nervures obscures.

Malgré la différence de taille, 22 au lieu de 40 mill., je rapporte à cette espèce un individu recueilli à Soalala par M. Perrier; seulement, l'abdomen est entièrement noir et la bande d'un jaune pâle qui occupe le milieu de la tête et du corselet s'étend aussi sur l'écusson.

CURCULIONIDÆ

Holonychus curtipennis. — Long. 17 mill. (*rost. incl.*). — Ressemble beaucoup, à première vue, à l'*H. saxosus* Coq., couvert également d'un enduit gris terreux, même sur les tubercules; mais

le corps est plus court, le corselet surtout qui est transversal, plus brusquement et plus brièvement rétréci en avant des angles, qui sont saillants de la même manière; il est coupé au milieu par un assez fort sillon transversal, en avant duquel sont deux tubercules assez gros, coniques, très obtus; la partie basilaire est unie, à peine plissée sur les côtés; le rostre a la même forme, fortement échancré en avant, sans ligne médiane; la tête est fortement convexe entre les yeux, comme renflée et dénudée, sans sillon transversal devant les yeux; les élytres sont bien plus courtes, non atténuées en goulot à la base et moins étroites; les gros tubercules sont à peu près les mêmes, mais les intervalles vers l'extrémité et sur les côtés sont couverts de petits tubercules; enfin les pattes sont de la couleur du corps, les tibias antérieurs à peine élargis à l'extrémité interne. — Baie d'Antongil (*Mocquerys*); collection du Muséum.

DINOSIUS n. g.

Corps oblong, assez convexe, comprimé latéralement. Tête courte, front large, rostre court, épais, séparé de la tête par un sillon plus ou moins angulé, scrobes en fossettes découvertes, placées au devant des yeux; yeux ronds, médiocres, convexes, touchant presque le bord du corselet; antennes assez longues, grêles; scape aussi long que le reste de l'antenne, grossissant vers l'extrémité, atteignant presque le milieu du corselet; les deux premiers articles du funicule allongés, formant ensemble presque la moitié du funicule, la massue ovulaire, grosse, acuminée. Corselet à peine plus long que large, un peu dilaté au milieu. Élytres oblongues, épaules obliques, effacées, surface rugueuse, granulations en lignes, se terminant par deux tubercules plus saillants. Hanches antérieures contiguës, saillie intercoxale large, tronquée, 2^e segment ventral presque aussi long que 2 et 3 réunis. Pattes médiocres, fémurs très claviformes, presque échancrés avant l'extrémité; tarses à 3^e article très large, profondément bilobé, le 4^e allongé, très grêle, à crochets petits, soudés.

Ce genre paraît voisin du g. *Mitophorus*, mais le rostre est plus court, non caréné sur les côtés et les scrobes sont en forme de fossettes médianes; les antennes sont moins longues et ne dépassent pas le milieu du corps, le scape s'épaissit peu à peu à l'extrémité, les yeux sont ronds, le corselet n'est pas cylindrique.

Dinosius asperipennis. — Long. 5 à 6 mill. (*rost. excl.*). — *Paulo elongatus*, *lateribus compressus*, *modice convexus*, *piceofuscus*, *indumento lutoso dense vestitus*, *lateribus interdum infus-*

catis; capite prothorace parum angustiore, fronte late medio sulcatulo, oculis distantibus, globosis, rostro brevissimo, denudato, scrobibus foveatis, apertis; antennis gracilibus, prothoracis basin paulo superantibus; hoc latitudine paulo longiore, fere medio leviter ampliato, antice attenuato, dorso rugoso, granulis aliquot setiferis sparsuto; elytris ovato-oblongis, basi et apice æqualiter angustatis, dorso subcostato-granulatis, granulis parum densatis, apice brevissime setosis, costula 1^a magis elevata et apice tuberculo majore instructo, lateribus deflexis magis striatis, intervallis dense rugosis, sutura parum elevata et laxe granulosa; subtus cum pedibus setulis ferrugineis dense vestitus, femoribus obscure annulatis. — Diégo-Suarez; ma collection.

Le sommet de la tête et le corselet, surtout au bord antérieur, portent des petites soies squamuleuses qui disparaissent facilement; le tubercule antéapical des élytres est un peu acuminé en arrière.

Platycopes globulus. — Long. 3 mill. (*rost. incl.*). — Ressemble à un très petit *P. lateralis* Fairm. (Ann. Soc. Fr., 1902, 353), d'un gris un peu cendré uniforme, avec les élytres globuleuses, moins fortement striées, le corselet parsemé de très petites soies brunâtres hérissées, ayant de chaque côté, à la base, un trait brun assez court et un autre au milieu du bord antérieur; les interstries des élytres sont presque plans, hérissés de petites soies extrêmement courtes; les pattes sont assez courtes, robustes et concolores. — Soalala (*H. Perrier*).

Engallus galactoderus. — Long. 9 mill. (*rost. excl.*). — Forme du *fasciculatus* Faust (*lacteocinctus* Fairm.), mais d'une sculpture bien différente; d'un brun foncé, avec les élytres parsemées de taches roussâtres avec quelques taches blanchâtres, plus nombreuses après le milieu et avant l'extrémité, le corselet ayant de chaque côté une large bande lactée qui se reproduit sur les fémurs; le rostre est assez épais, cylindrique; le corselet, moins étroit, est plus élargi à la base, plus rétréci en avant, bien moins rugueux, la bande latérale plus large, plus courte; les élytres sont fortement angulées aux épaules, qui sont moins saillantes et nues; la base n'a pas de tubercules squameux, l'extrémité non plus; les lignes de points sont bien plus fines, plus régulières, les intervalles faiblement convexes; les pattes sont aussi robustes. — Baie d'Antongil (*Mocquerys*); coll. du Muséum.

RHYPASTUS n. g.

Ce nouveau genre de Curculionide se rapproche beaucoup des *Platyomicus* dont il présente le facies; il en diffère par le rostre

assez allongé, assez fortement élargi à l'extrémité, par les antennes à scape plus long, plus grêle, le funicule aussi long que le scape, à articles également serrés, mais moins larges, le dernier ovoïde-oblong, à peine plus épais; les yeux sont à peine convexes, le corselet est plus court, avec deux gros plis sur le disque; l'écusson est presque indistinct; les élytres sont plus larges, plus carrées, plus brusquement déclives à l'extrémité, avec des lignes plus ou moins tuberculées et de gros tubercules à l'endroit où la déclivité commence; les pattes sont également fortes, un peu plus courtes; la saillie intercoxale est également large et tronquée.

Ce genre intéressant représente à Madagascar le g. *Platyomicus* de la Guinée et du Gabon; la forme du rostre et du scape des antennes le différencie sérieusement.

Rhypastus truncatulus. — Long. 7 à 7 1/2 mill. (*rost. excl.*). — Breviter ovatus, crassus, piceus, opacus, lutoso indutus, tuberculis et elytris basi aut dorso medio transversim denudatis; rostro lutoso, medio sulcatulo, antennis fusco-piceis; prothorace elytris angustiore, antice a medio sat fortiter angustato, basi fere recta, dorso tuberculis 2 ovatis rugosis antice instructo, lateribus granulosis; elytris sat brevibus, subquadratis, basi utrinque paulo obliquatis, ad humeros angulosis, vage punctato-striatis, basi utrinque costis 2 crassis, laxe tuberosis, post medium oblitteratis, intervallis paulo rugosulis, postice ad declivitatem sat abrupte truncatulis utrinque tuberculis 2 majoribus et 2 minoribus ornatis, lateribus deflexis grosse punctato-seriatis; femoribus paulo lutoso-annulatis. — Région de l'Androy, Ambovomté (*D^r Decorse*).

La coloration est inégale et variable.

Rhytiplæus ovipennis. — Long. 12 mill. — Oblongo-ovatus, convexus, fusco-piceus, indumento piloso dilute cinerascens in prothorace maculatus et in elytris medio late fasciatus, his basi apiceque maculis minutis signatis; rostro cylindrico, nudo, dense punctato. Antice lineis elevatis minutis signato, antennis sat gracilibus, picescentibus; prothorace transverso, elytris angustiore, lateribus antice fortiter angulato, dorso utrinque tuberculo rubiginoso-velutino ornato, lateribus setulis rubiginosis marginato; elytris brevissime ovatis, valde convexis, leviter striatis, intervallis grosse granosis, alternatim magis convexis, basi fortius granatis et utrinque tuberculis fusco-velutinis ornatis, intervallo 3^e, 5^e et 7^e plagam transversam tuberculis majoribus instructis, margine laterali ante apicem sinuato; pedibus validis, cinereis. — Madagascar; collection du Muséum.

Cette espèce est bien distincte par la forme des élytres très brève-

ment ovâlares et par les intervalles granuleux, alternativement plus convexes et portant des tubercules ovalaires; elle se rapproche du *R. nodosus* Fairm. pour la forme générale, mais plus courte, et la sculpture des élytres est toute différente.

Rhytiphlæus holonychinus. — Long. 20 mill. — Oblongo-elongatus, antice attenuatus, postice magis convexus, piceus, indumento fuliginoso vestitus; pedibus sat griseis, femoribus omnibus medio infuscatis; capite brevi, oculis minutis, linea pallidiore circumductis, rostro crasso, apice haud crassiore; prothorace longitudine vix latiore, antice utrinque angulato, medio compresso-convexo, dorso paulo inæquali; elytris ovatis, postice parum ampliatis, parum fortiter plicato-tuberosis, tuberculis subseriatis, intervallo discoïdali postice magis elevato, tuberculis lateralibus majoribus; abdomine lateribus maculis dilutioribus signato. — Madagascar; ma collection.

Ressemble assez au *R. albipes* Ol., mais plus étroit, plus convexe en arrière, comprimé latéralement, avec le corselet plus long, moins inégal, et les élytres à tubercules bien moins gros, plus nombreux, formant presque des séries; le rostre n'a pas de lignes blanches, non plus que les pattes qui sont grises avec une tache sur les fémurs. Diffère de *l'ovipennis* par la taille plus forte, le corselet et les élytres plus courts, ces dernières à tubercules plus gros, moins nombreux, en séries alternées.

G. STENOPHYLAX Fairm., Ann. Soc. Ent. Fr., 1903, 343.

Ce nom a déjà été employé en 1848 par Kolenati pour un genre de Phryganides. Je dois cette rectification à un avis bienveillant de notre collègue, M. Mac Lachlan. Je propose de changer le nom de ce genre en *Hypophylax*.

Bagous striatulus. — Long. 4 1/2 mill. — Ressemble au *B. impressus* Fairm. (Ann. Belg., 1897, 128), mais plus noirâtre, avec le corselet assez arrondi sur les côtés, ayant de vagues bandes plus noires, les élytres plus fortement striées, avec des intervalles un peu convexes, également relevés, sans impressions obliques sur le disque, ayant aussi chacune une tache blanche mais plus large et moins distincte, sans calus postérieurs; le corselet est moins fortement impressionné au bord antérieur, ce qui le rend moins relevé; les fémurs paraissent plus grêles à la base. — Soalala (*H. Perrier*).

Echinocnemus gracilirostris. — Long. 3 mill. (rost. excl.). — Ovatulus, indumento piceolo dense vestitus, capite summo, prothorace vittulis 3 griseis, elytris cinereis, vittulis griseis alterne ornatis, sutura infuscata, post medium grisea, subtus cum femorum

basi dense griseus, femoribus posticis medio piceo maculatis; capite sat minuto, oculis sat distantibus rostro leviter arcuato, tenui, denudato; prothorace longitudine haud latiore, elytris valde angustiore, lateribus rectis, antice tantum arcuato-angustatis, subtiliter densissime punctulato; elytris sat breviter ovatis, basi truncatis, ad humeros angulatis, striatis, striis subtilissime punctulatis; intervallis vix convexiusculis, dense subtilissime punctulatis, setulis brevibus laxè instructis; pedibus sat validis, femoribus basi breviter angustatis, cum tibiis setulis minutissimis indutis. — Soalala (*H. Perrier*).

Ressemble beaucoup à l'*E. nereis* Faust, mais plus court, à corselet plus étroit, non arrondi sur les côtés, et surtout par le rostre bien plus mince, plus long et arqué.

Lithinus Perrieri. — Long. 20 mill. (*rost. excl.*). — Oblongus, postice ampliatus et truncatulus, convexus, ater, opacus, indumento griseo lateribus et apice vestitus; rostro crasso, parum dense punctulato, inter oculos foveola minuta impresso; prothorace vix transverso, antice angulatim dilatato, et abrupte constricto, dorso tuberculis 5 politis ornato, antico majore fisso, 2 posticis minutis, lateribus griseis, punctis nigris impressis, antice breviter interruptis; elytris postice convexioribus et latoribus, dorso nigris, parce griseo punctatis, lateribus late griseis, punctis nigris seriato-impressis, parte apicali similiter grisea et punctis grossis, ad marginem externum foveatis, nigris impressa, dorso seriatim granatis, granis postice majoribus et ad declivitatem interruptis, colore nigro extus extenso, lateribus basi plaga nigra ornatis; subtus nigra, late griseo-tincta et punctis nigris impressa, pedibus validis, griseis, punctulis nigris sparsutis, femoribus apice nigris. — Ambongo (*Perrier*).

Cette belle espèce se rapproche du *L. humeralis* Coq. pour le genre de coloration, mais elle est bien plus grande, plus robuste, le corselet est très différent, sans saillies antérieures, fortement angulé sur les côtés, ayant le dos uni avec 5 tubercules lisses.

Lithinus parcelactus. — Long. 16 mill. (*rost. excl.*). — Oblongus, paulo compressus, fortiter convexus, piceo-fuscus, subopacus, prothorace basi utrinque lineola lactea, supra elytrorum basin paulo expansa ornato, elytris paulo ante medium fasciola transversa et fascia apicali transversa communi lacteo-tomentosis signatis; capite convexiusculo, squalide rufescente, fronte medio impressa, rostro crasso, supra inæquali, haud sulcato, apice vix angustato; prothorace elytris duplo angustiore, ovatulo, lateribus haud ampliato, antice parum angustato, margine antico fortiter anguloso-rotundato, dorso tuberculis minutis, sat numerosis

instructo, intervallis squamulis ferrugineis parce signalis, margine postico utrinque sinuato; scutello convexo, polito; elytris basi fere truncatis, parum lobatis, basi et lateribus subseriatim tuberculato-asperatis, basi fortius et magis regulariter, intervallis punctis grossis seriatim, medio utrinque macula obscure rufo-squamosa parum distincte signalis, plaga apicali floccosa, utrinque expansa; pedibus validis, crassis, squamulis et setulis ferrugineis obsitis, tibiis anticis albido-floccosis, femoribus anticis dente angulari armatis, pectore lateribus paulo floccoso. — Baie d'Antongil (*Mocquerys*); coll. du Muséum.

Diffère des autres *Lithinus* par son corps plus large, ses élytres carrées à la base et son corselet non dilaté sur les côtés et sans houpes de poils au bord antérieur.

Achymus tessellatus. — Long. 5 mill. (*rost. excl.*). — Ressemble à l'*A. Althaudi* Fairm. (Ann. Ent. Fr., 1902, 362), mais plus petit, d'un gris sale pubescent avec de nombreuses petites taches noires sur les interstries qui sont un peu convexes, où elles alternent avec les taches grisâtres; le corselet est plus large, plus court, plus uni, moins prolongé en avant; les interstries des élytres sont réguliers et alternativement un peu relevés; le rostre est un peu plus long et un peu plus arqué; les pattes antérieures sont également énormes. — Soalala (*H. Perrier*).

Lixus gigas (Faust, *in litt.*). — Long. 32 mill. (*rost. excl.*). — Elongatus, niger, modice nitidus, prothorace utrinque impressione oblonga, plicata, breviter fulvo-pilosula signata, elytris maculis minutis numerosis similiter pilosulis sparsutis subtus cum pedibus nitidior, pectore medio, annulo femorali et tibiis fere totis fulvo-pilosis; rostro valido, medio fere crassiore, basi et post medium foveola minuta impresso; prothorace elytris paulo angustiore, latitudine longiore, antice angustiore, medio canaliculo basi profundiore, antice oblitterato signato, utrinque subtiliter oblique plicatulo, plicis anticis validioribus, ad latera impressione irregulari, intus plicatula, pilosa ornato; scutello minuto, polito; elytris elongatis, ad humeros angulatis, postice levissime ampliatis, sat late striatis, striis punctato-crenulatis, punctis sat grossis, parum profundis, interstriis convexis, 2 primis latioribus, basi valde elevatis, ceteris alternatim magis convexis, impressione circa scutellari sat depressa, striis pube fulvida maculosis, penultima externa basi latiore et griseo-ciliata, subtus lævis, segmentis ventralibus apice fulvido pilosulis, pedibus validis, femoribus anticis subtus angulatis. — Madagascar; ma collection.

Lixus floccosus. — Long. 22 à 26 mill. (*rost. excl.*). — Forme et coloration du *gigas*, mais plus petit et un peu plus brillant; le rostre est semblable, mais plus visiblement ponctué, la fossette de la base plus marquée; le corselet est aussi large à la base que les élytres, plus court, moins atténué et plus brusquement rétréci en avant; le sillon médian bien plus fin, de chaque côté des plis assez fins, irréguliers, et deux impressions, la postérieure plus grande, l'antérieure garnie chez les individus frais, d'une villosité cotonneuse d'un gris sale, formant touffe, la partie lisse antérieure courte, mais se prolongeant au milieu le long du sillon; les élytres sont moins longues, plus fortement striées-ponctuées; les intervalles réguliers, fortement épaissis tout à fait à la base où ils forment des empâtements, des faisceaux de poils d'un fauve sale, plus ou moins denses; le dessous et les pattes sont plus brillants, les dernières à villosité semblable, également robustes. — Farafangana (*Cotta*); ma collection.

Quand cet insecte est bien conservé, les deux grosses touffes de poils du corselet lui donnent un faciès remarquable; il en est de même pour l'espèce suivante.

Lixus albicornis. — Long. 25 mill. — Ressemble extrêmement au *floccosus*, notamment par la vestiture, le corselet présentant aussi de chaque côté, en avant, une touffe de poils plus blanchâtres; les élytres sont ornées de faisceaux semblables, qui deviennent plus épais en arrière et forment des taches à l'extrémité; le rostre a la même forme, mais la fossette entre les yeux est plus grande et se prolonge en s'effaçant en avant; le corselet a la même forme, il est à peine plus étroit que les élytres; le sillon médian a disparu, sa surface est comme vermiculée de plis et de sillons qui sont remplis d'un enduit blanchâtre; la partie lisse antérieure est extrêmement réduite et sillonnée au milieu; le bord postérieur est fortement bisinué, angulé au milieu avec les angles très aigus; l'écusson est déprimé; les élytres ont une sculpture analogue, mais les points sont remplacés par des fossettes; les intervalles sont plus étroits, sauf sur les côtés, et sont parsemés de petits pinceaux de poils; la base est assez fortement tuberculée; le dessous et les pattes sont semblables; les tibias antérieurs sont garnis en dehors de longs poils gris; enfin, le funicule et la massue des antennes sont blancs. — Diégo-Suarez; ma collection.

Lixus dorsotinctus. — Long. 25 mill. (*rost. excl.*). — Ressemble au *floccosus*, mais plus parallèle, presque cylindrique, le corselet presque aussi large que les élytres, bien plus court; d'un noir brillant avec toute la partie dorsale des élytres ainsi que le

milieu du corselet couverts d'un enduit gris plombé; le rostre est plus droit, finement ponctué en avant, avec un court sillon médian, une fossette oblongue à la base; le corselet est bien plus court, plus fortement rétréci en avant, avec un sillon médian bien plus fortement creusé à la base; de chaque côté des plis très irréguliers, assez courts, un ou deux plus relevés, et sur les côtés des poils fauves assez nombreux, mais ne formant pas une touffe, la partie antérieure unie au milieu; les élytres sont bien plus longues, à stries garnies de gros points, plus gros à la base et sur les côtés, les intervalles marquetés de petites taches noires écartées avec des soies blanches hérissées peu nombreuses, les intervalles plans à la suture, assez convexes sur le disque, mais bien plus relevés et plus étroits sur les côtés; le dessous et les pattes sont d'un noir brillant, quelques poils fauves sur la poitrine, les tarses très larges. — Madagascar; ma collection.

L'enduit des élytres rappelle ce qui existe chez *l'encaustus* Faust, mais l'insecte est très différent.

Lixus bituberosus. — Long. 16 à 18 mill. (*rost. excl.*). — *Elongatus, convexus, fuscus, parum nitidulus, prothorace elytrisque basi punctis et impressionibus albido-pubescentibus sparsutis, his ante apicem maculis similibus densioribus transversim subfasciatis, apice irregulariter maculosis; rostro subtilissime punctulato, basi medio puncto vix impresso; prothorace elytris angustiore, latitudine paulo longiore post medium antice angustato, antice sat fortiter coarctato, dorso parum fortiter plicatulum rugoso, parte antica lævi, elytris elongatis, ad humeros obliquatis, his obtusis, basi medio tuberculo rotundo polito ornatis, haud incrassatis, nec impressis, dorso paulo inæqualibus punctato-lineatis, punctis distantibus, lineis postice obsolete, intervallis planis; pectore parce albido sparsuto, femoribus annulatis, tibiis tarsisque dense albido pubescentibus, femoribus anticis subtus breviter dentatis, tibiis compressis, leviter arcuatis.* — Diégo-Suarez; ma collection.

Ressemble beaucoup à *l'Ileomus Bohemanni* Faust, mais ce dernier est plus grand, plus robuste, les rugosités du corselet sont plus fines, les élytres ont des lignes de très gros points qui s'effacent presque à la bande transversale postérieure, les fémurs antérieurs sont armés d'une forte dent, plus petite chez les autres fémurs.

Il me paraît que ces insectes ne peuvent être séparés des *Lixus* dont plusieurs espèces, telles que le *L. Sturmii*, offrent aussi des fémurs dentés ou angulés en dessous.

Le *L. bituberosus* est remarquable par les deux tubercules de la base des élytres qui sont plus gros et plus saillants que chez les

L. bifloccosus, et aussi gros que chez le *Bohemanni*; les taches pubescentes des élytres sont très variables et dessinent parfois une espèce de bande oblique sur le milieu des côtés.

Lixus humerosus. — Long. 16 mill. — Ressemble beaucoup au précédent, mais un peu plus petit et plus étroit; la coloration est presque la même, seulement les impressions de la base des élytres sont remplies d'une pubescence blanchâtre mélangée de roux et la fascie postérieure est plus grise; la sculpture du corselet ressemble à celle du *Bohemanni*, mais les côtés ont, en avant, une sorte de tubercule irrégulier; les élytres ont la base un peu épaissie, mais sans tubercule distinct, elles ont des lignes de gros points comme chez le *Bohemanni*, mais plus petits, avec les intervalles peu convexes, sauf les 2^e et 4^e qui sont plus épais à la base, la partie postérieure est un peu plissée; les fémurs sont à peine annelés, les antérieurs munis d'une petite dent peu distincte, les tibias antérieurs garnis de pubescence grise serrée. — Baie de Antongil; ma collection.

Zantes convexicollis. — Long. 3 1/2 mill. (*rost. excl.*). — Brevissime ovatus, fuscus, parum nitidus, capite prothoraceque opaculis, fulvido-pilosulus; capite cum rostro dense subtiliter punctulatis, illo densius piloso, fronte medio subtiliter striata, rostro denudato, magis rugoso, antennis gracilibus, piceis, articulis 2 primis rufis; prothorace transverso, antice angustato, lateribus arcuatis, dorso dense subtiliter rugoso; elytris subglobosis, postice attenuatis, ad humeros obliquis, fortiter striatis, striis parum punctatis, basi paulo evidentius; subtus indumento tenui fulvido dense vestitus, albido mixtus, pedibus validis, femoribus anticis crassioribus, subtus dentatis. — Ankarahitra (*H. Perrier*).

Cet insecte diffère de ses congénères par le manque de dépression sur et autour de l'écusson et par le bord postérieur du corselet coupé droit.

Zantes rufinus. — Long. 2 mill. (*rost. excl.*). — Brevissime ovatus, convexus, rufocastaneus, nitidus, glaber; capite cum rostro dense subtiliter punctulato; prothorace transverso, antice angustato, lateribus rotundato, dense sat subtiliter granuloso-punctato, margine postico medio lobato, lobo ad scutellum depresso; scutello griseo pubescente; elytris brevibus, ad humeros sat angulatis, postice fortiter declivibus et abrupte rotundatis, dorso sat fortiter punctato-striatis; subtus albido-pubescent, pedibus brevibus, validis, femoribus anticis inermibus. — Ankarahitra (*H. Perrier*).

Ressemble à *Z. holoxanthus* Fairm. (*Ann. Soc. Belg.*, 1901, 224), mais bien plus petit, d'une coloration plus foncée, plus rougeâtre,

avec le corselet plus étroit, plus arrondi sur les côtés, à lobe médian moins saillant, et avec les élytres plus fortement striées avec les stries moins fortement ponctuées.

Desmidophorus griseipes. — Long. 16 mill. (*rost. excl.*). — Oblongo-ovatus, convexus, niger, opacus, pilis lutoso-griseis paulo acervatis adpersus, elytris tuberculis atrovelutinis ornatis; capite dense anguloso-punctato, parce piloso, rostro minus fortiter, apice laeviore; prothorace transverso, brevior, antice a medio sat fortiter angustato, dense granuloso-rugoso, disco minus dense et plaga atrovelutina signato, lateribus villosulis, basi evidenter late bisinuata, sat fortiter marginata; elytris ovatis, lateribus fere rectis, ad humeros paulo angulatis, vix productis, apice obtuse rotundatis, tuberculis mediocribus, sat dense subseriatim munitis, externis magis acutis, intervallis paulo inæqualibus, parce piloso-maculosis; subtus cum pedibus nigro-fuscus, femoribus apice et tibiis dense lutoso-griseo pilosulis, pilis adpressis, femoribus anticis subtus obtuse angulatis. — Madagascar; ma collection.

Ressemble au *D. floccosus* Fairm. (Ann. Belg., 1901, 125) pour sa forme oblongue et ses élytres presque droites sur les côtés; elles sont moins atténuées en arrière avec des séries de tubercules médiocres, les intervalles inégaux, avec des restes de touffes poilues qui changeraient sans doute le faciès de cet insecte avec des exemplaires plus frais.

DESMIDOPHORUS CENTRALIS Fairm., Le Naturaliste, 1902, 10.

Ce nom doit passer en synonymie du *D. galericulus* Fairm.; c'est une variété dont la coloration est plus accentuée; notamment la tache centrale sur la suture est presque noire au lieu d'être rousse; le *D. galericulus* est un individu à coloration incomplète et le *centralis* serait plutôt le type de l'espèce.

Alcides albopictus. — Long. 8 mill. (*rost. excl.*). — Ressemble extrêmement à l'*A. lobipennis* Fairm. (Ann. Soc. Fr., 1902, 365) pour la forme, la sculpture et le genre de coloration, mais un peu plus grand, avec le corselet couvert de granulations lisses, inégalement serrées, ayant de chaque côté à la base une sorte d'anneau formé par des soies squamuleuses blanchâtres; les élytres sont également lobées à la base, mais plus longues, avec les fossettes semblables, mais les intervalles moins régulièrement relevés, une petite tache humérale et une courte bande formée de deux taches de poils squamuleux blancs, placée transversalement en dehors après le milieu; dessous du corps très ponctué, côtés et milieu de la poitrine et base de l'abdomen couverts de poils squamuleux blancs, pattes courtes, robustes, rugueusement ponctuées, parse-

mées de très petites soies blanchâtres, fémurs et tibias antérieurs armés en dessous d'une large dent. — Diégo-Suarez; ma collection.

Phylaitis sanguinosus. — Long. $3\frac{1}{2}$ à 5 mill. — Oblongus, fuscus, opaculus, prothorace antice cum genis sanguineo-velutino, basi medio lineola albo-puberula, plus minusve distincta, scutello albo, elytris griseo setosulis, subtus cum pedibus densius setosulis; oculis contiguis, rostro leviter arcuato, tenuiter asperulo, antennis fuscis, apice clavatis; prothorace subquadrato, elytris haud angustiore, antice breviter constricto et utrinque transversim sulcato, dorso subtiliter densissime ruguloso, lateribus rectis; scutello minuto, convexo; elytris brevibus, cuneatis, prothorace haud latioribus, subtiliter striatulis, intervallis planis laxe granosis, apice subtruncato, extus rotundato; prosterno rufulo-squamosulo, dentibus 2 acutis armato, pedibus modice elongatis, femoribus posticis elytra parum superantibus, anticis vix ceteris longioribus. — Région de l'Androy, Imavombo (*D^r Decorse*); coll. du Muséum.

Ressemble extrêmement au *P. Coquerellii* Fairm., en diffère par l'armure du prosternum, le corselet couvert en avant d'un velours couleur de sang, sans tache à l'angle postérieur, le corselet moins rugueux, les élytres à interstries finement granuleux. Il n'est pas probable que ce soient des ♀ du *Coquerellii* qui se trouve dans le nord de l'île.

Metialma pusilla. — Long. 2 mill. (*rost. excl.*). — Angusta, supra planiuscula, subtus convexo, dilute fulva, fusco maculosa; oculis magnis, contiguis, rostro fusco, nudo, vix arcuato; prothorace latitudine fere duplo longiore, elytris haud angustiore, antice tantum paulo attenuato, dorso fusco, lateribus dilute fulvis, dense subtiliter strigosulo-punctato, linea media obsolete elevata, margine postico fere recto; elytris oblongis, postice attenuatis, apice conjunctim rotundatis, subtiliter punctato-lineatis, basi substriatulis, stria suturali impressa; pygidio et propygidio rufis; subtus sat dense griseo-pilosulus, pectore punctato, pedibus sat brevibus, fuscis, parce griseo-pilosulis. — Ankarahitra (*H. Perrier*).

Reconnaissable à sa petite taille et au dessin des élytres formé de maculatures brunes oblongues, mélangées de linéoles courtes.

METIALMA APICALIS Fairm., Ann. Belg. 1902, 242 (*Epiphylax*).

C'est par erreur que cet insecte a été décrit comme appartenant au g. *Epiphylax*, avec lequel il n'a guère de rapports.

ASTRATUS n. g.

Ce nouveau genre est voisin des *Cryptorhynchus*, dont il diffère par le corselet transversal, fortement arrondi sur les côtés et brusquement rétréci en avant, par le canal rostral ne dépassant pas les hanches antérieures, le rostre bien moins épais, se terminant sur le mésosternum dans une cavité assez grande, sans bourrelet; la saillie intercoxale est semblable, mais le 2^e segment ventral est à peine plus long que chacun des suivants; les pattes sont assez grêles, avec les fémurs tous très claviformes et dentés en dessous.

Astratus cristulicollis. — Long. 6 1/2 mill. (*rost. excl.*). — Oblongus, convexus, piceo-fuscus, opaculus; capite convexo, cum rostro subtiliter rugosulo, hoc apice lævi; prothorace transverso, lateribus fortiter rotundato, antice valde angustato, basi elytris sensim angustiore, dorso densissime asperato-punctato, disco subtilius, antice cristulis minutis squamosis signatis, angulis posticis valde obtusis; elytris ovato-subquadratis, basi truncatis, ad humeros angulato-rotundatis, grosse subseriatim punctatis, costulis interruptis parum regularibus instructis, rugosulis; subtus grosse punctatus, pedibus sat gracilibus, femoribus clavatis, subtus dente armatis, tarsorum articulo 3^e profunde bilobo, 4^e elongato. — Baie d'Antongil; ma collection.

MAMUCHUS n. g.

Genre bien voisin du g. *Astratus* dont il offre la facies; le canal rostral se termine aussi sur le métasternum dans une fossette; la saillie intercoxale est également large et obtusément tronquée; mais le 2^e segment ventral est soudé au 1^{er} et est un peu plus long que les 2^e et 3^e réunis; les élytres enveloppent mieux les côtés du corps, les pattes sont plus robustes, les fémurs sont inermes, les tarses sont plus larges. Le corselet, à peine arrondi sur les côtés, est brusquement rétréci avant les angles antérieurs.

Mamuchus squamosopictus. — Long. 6 mill. (*rost. excl.*). — Ressemble assez à l'*Astratus cristulicollis*, mais plus petit, plus parallèle, de même coloration brune, parsemé de nombreuses petites taches formées par de petites squamules d'un fauve obscur; le sommet de la tête est lisse et roussâtre; le corselet est moins convexe, moins arrondi sur les côtés, également très rétréci en avant, très densément rugueux; les élytres sont plus fortement angulées aux épaules, régulièrement mais peu fortement striées, les stries

plus ponctuées à la base, les intervalles plans, les 3° et 5° un peu convexes, ce dernier formant un léger calus antéapical; les pattes sont plus robustes, les fémurs antérieurs sont armés d'une dent assez large, mais peu saillante, les autres sont un peu angulés en dessous. — Soalala (*H. Perrier*).

Mamuchus inornatus. — Long. 5 mill. — Diffère du précédent par le corps plus petit, plus parallèle, le corselet un peu plus arrondi sur les côtés, non anguleusement rétréci en avant, plus finement ponctué, les élytres parallèles, plus angulées aux épaules, à stries assez régulières, les intervalles presque plans, parsemés, comme le corselet, de petites taches roussâtres, mais ne formant pas de touffes squamuleuses, oblongues ou confluentes; la tête est convexe, lisse, roussâtre; les fémurs antérieurs sont faiblement angulés en dessous. — Ankarahitra (*H. Perrier*).

Nanophyes spinicrus. — Long. 4 1/2 mill. (*rost. excl.*). — Ressemble au *N. albicollis* Fairm. (Notes Leyd. Mus., 1901, 76), à peine plus grand, mais plus massif et d'une coloration différente, d'un brun noir, avec des fascies fuligineuses sur les élytres, une ligne médiane et deux bandes latérales sur le corselet avec la base des fémurs fuligineuses; le métasternum est orné, sur les côtés, d'une grande tache blanche subtriangulaire; le rostre est plus long; les cinq derniers articles des antennes forment une massue comprimée, lâche; le corselet est plus large; les élytres sont plus amples, nettement striées, avec les intervalles également convexes; les pattes antérieures sont aussi un peu plus longues que les autres, fortement claviformes, armées en dessous d'une dent aiguë avec deux très petites saillies en avant. — Diégo-Suarez; ma collection.

Le nombre des articles de la massue antennaire vient appuyer ce que dit Lacordaire à ce sujet; seulement, il me semble qu'il faut chercher les deux articles disparus dans le dernier article de la massue et non dans les premiers.

Nanophyes magnus. — Long. 7 mill. (*rost. excl.*). — Ressemble au précédent, plus grand et plus robuste, d'une coloration analogue, mais moins sombre; le rostre est noir, grêle, presque deux fois aussi long que le corselet; celui ci est d'un gris, un peu fauve avec une ligne médiane plus pâle se prolongeant sur la tête, sur les côtés des taches brunes peu régulières, la partie antérieure plus étroite et plus comprimée; les élytres sont d'un fauve cendré, avec une grande tache basilaire brune, transversale, veloutée, un peu prolongée à l'écusson sur la suture, au milieu de chaque côté, une grande tache externe brune, les stries peu profondes, les

intervalles alternativement convexes ainsi que la suture, d'un gris pâle avec des taches brunes; les pattes antérieures un peu plus longues que les autres; les fémurs sont très claviformes, les antérieurs armés en dessous d'une épine aiguë assez longue, avec deux très petits denticules; la massue des antennes est à peine moins longue que le funicule, et son dernier article aussi long que les deux précédents réunis. — Baie d'Antongil (*Mocquerys*); coll. du Muséum.

Cionus elegantulus. — Long. *vix* 2 mill. (*rost. excl.*). — Fere globosus, rufulo-piceus, pilis albido-griseis adpressis dense vestitus, capite dilute rufulo, prothorace basi piceolo, scutello piceo, elytris ad humeros longius albido-pilosis, macula media suturali communi rufa et antice utrinque puncto piceo comitata, utrinque ante apicem macula marginali oblonga denudata ornatis; capite convexo, rostro parum arcuato; prothorace brevi, angusto, antice attenuato, dorso medio pilis erectis densatis ornato; elytris valde convexis, ad humeros angulatis, postice levissime attenuatis, subtilissime striatulis, setulis albis laxè hispidulis, setulis baseos fuscis; subtus cum pedibus concolor, his brevibus, sat validis. — Soalala (*H. Perrier*); un seul individu.

Bien remarquable par sa petite taille et sa vestiture élégante.

Baris distinguenda. — Long. 3 1/2 mill. (*rost. excl.*). — Ressemble à *B. suturata* Fairm. (1), également d'un brun noir mat avec une bande formée d'écailles fauves sur le milieu du corselet, se prolongeant sur la suture des élytres en s'élargissant, puis formant une tache transversale après le milieu, n'atteignant pas le bord externe, et un point de même coloration à l'extrémité; le corps est plus grand, plus allongé; les élytres sont un peu parallèles, à stries moins distinctes; le corselet est plus rugueux, n'ayant, en outre de la bande médiane, qu'une très petite tache d'écailles fauves aux angles postérieurs; le dessous du corps est unicolore, parsemé de très petites écailles fauves ainsi que les pattes qui sont aussi finement et assez densément ponctuées. — Ankarahitra (*H. Perrier*).

Les bandes et taches sont formées d'écailles rousses, serrées, tandis qu'elles sont éparpillées chez la *suturata* et d'une couleur rousse, formant des dessins bien nets; le corps est aussi plus oblong.

(1) Un individu de Diégo-Suarez a 6 mill. de longueur, mais je ne vois pas de différences sérieuses.

NYCTERORHINUS n. g.

Ce nouveau genre me paraît voisin des *Crepidotus*, bien que son facies soit fort différent; le corps est, en effet, très lisse, d'un noir d'ébène et le corselet est presque aussi long que les élytres; sa base est, en outre finement mais nettement rebordée; le prosternum est large entre les hanches; le métasternum est aussi impressionné à l'extrémité mais moins fortement; les pattes antérieures sont plus fortes, mais pas plus longues que les autres; les tibias antérieurs sont presque droits, munis à l'extrémité d'un crochet, garnis en dedans de soies raides, fauves; le pénultième article des tarses est aussi très large, cordiforme; la tête est semblable, les yeux plus petits; les antennes sont insérées de même, assez grêles; le scape est un peu épaissi à l'extrémité et dépasse le bord du corselet; les deux premiers articles du funicule sont allongés, égaux; le dernier article est oblong, plus épais, tronqué très obliquement et bordé d'une pubescence rousse.

Nycterorhinus ebenus. — Long. 15 à 16 mill. — *Elongatus*, dorso planiusculus, niger, nitidus, femoribus piceis; capite punctulato, rostro gracili, subtiliter punctulato, apice extremo lævi, prothorace parum brevior; prothorace oblongo-ovato, antice attenuato, parte collari angustiore, leviter punctulato, latitudine duplo longiore, transversim impressa, dorso planiusculo, lævi, paulo depresso, margine postico recto, tenuiter marginato, angulis fere rectis, scutello mediocri, depresso, fortiter marginato; elytris prothorace paulo longioribus, ab humeris leviter attenuatis, his valde rotundatis, dorso medio planiusculis, punctato-lineatis, punctis basi obsolescentibus, intervallis planis, lævibus, stria suturali profunda, apice late rotundato, subtruncatulo; pygidio fusco-piceo, paulo ocellato-punctato, lateribus marginato; subtilis lævis, lateribus punctulato, pedibus validis, anticis crassioribus, tibiis anticis intus dense ciliatis, tarsorum articulo penultimo magno, cordato, vix sinuato; ♀ vix minor, prothorace paulo angustiore, dense punctulato, medio haud depresso, elytris vix distincte lineato-punctatis. — Baie d'Antongil (*Mocquerys*); coll. du Muséum.

Dichthorrhinus albozebrinus. — Long. 10 mill. (*rost. excl.*) — Oblongus, postice attenuatus, modice convexus, ater, opacus, paulo sericans, prothorace linea subapicali transversa tenui, lateribus et subtilis continua et vitta latiore basali medio interrupta lacteis, elytris utrinque lineam brevi subscutellari et utrinque vittis 2 angustis lacteis, suturam haud attingentibus,

1^a ante, 2^a post medium; oculis vix separatis, rostro tenui, recto, elongato, basi incrassato et cornutus 2 crassis arcuatis armato, antennis parum gracilibus fuscis; prothorace latitudine fere longiore, antice a medio angustato, dorso convexo; elytris fere a basi angustatis, punctulato-striolatis, intervallis planis; pygidio fere conico, apice breviter rufo et griseo penicillato; metasterno late lacteo plagiato, pedibus sat gracilibus, anterioribus paulo majoribus, albo tenuiter lineatis, tibiis anticis intus denticulatis. — Baie d'Antongil (*Mocquerys*); coll. du Muséum.

Le dessin des élytres différencie cette espèce de ses congénères.

STENOLANDRA n. g.

Ce nouveau genre est extrêmement voisin du g. *Catapyges* qu'il représente à Madagascar; il a la même forme étroite, la même coloration noire avec des bandes blanches, mais le rostre est étroit, plus long que le corselet, grêle, presque horizontal, nullement arqué; les antennes assez grêles, insérées tout à fait à la base du rostre, dépassent le milieu du rostre et atteignent presque la base du corselet; les articles du funicule sont oblongs, la massue oblongue, un peu acuminée; le corselet est grand, faiblement rétréci en arrière, plus fortement en avant où il est rétréci en forme de col court avec un profond sillon en dessus; les côtés sont arqués, la base est tronquée; l'écusson est petit, acuminé; les élytres sont un peu plus longues que le corselet, rétrécies depuis la base, presque cunéiformes, arrondies à l'extrémité, à peine sinuées en arc à leur base; le pygidium est déclive; les pattes sont assez grandes, les antérieures plus développées, les intermédiaires plus courtes; les tibias antérieurs sont droits, terminés par deux éperons arqués, le pénultième article des tarses très grand, très large, le dernier étroit, assez grêle.

Stenolandra lacteostrigata. — Long. 7 mill. (*rost. excl.*). — Elongatus, angustus, parum convexus, ater, opacus, lineis tenuibus albis supra ornatus, prothorace utrinque linea integra, antice paulo arcuata et lineola media brevi, pleuris albis, elytris vitta suturali, utrinque lineis 2 discoïdali et marginali, hac basi interrupta, striga humerali brevissima et punctulis aliquot albis, pectore et abdomine lateribus valde albo-fuscatis; rostro elongato, recto, gracili, nitido, antennis basalibus, articulis funiculi oblongis, 2^o primo paulo longiore, clava oblonga, sat acuminata, prothorace basi parum medio haud elytris angustiore, antice angustato et paulo constricta, transversim fortiter sulcato, dorso dense asperato;

elytris paulo cuneatis, basi fere rectis, apice rotundatis, subtiliter striolatis, basi breviter evidentius, intervallis planis, subtiliter coriaceis; pygidio albo, lateribus nigro; subtus punctatus, pedibus magnis, anticis præsertim, punctatis et squamulis minutissimis pallidis vestitis, tibiis carinulatis. — Baie d'Antongil (*Mocquerys*); coll. du Muséum.

CERAMBYCIDÆ

Marocaulus granicollis. — Long. 11 mill. — Forme et coloration du *M. impressicollis* Fairm. (Ann. Fr., 1899, 502), en diffère par la taille plus faible, le corselet nullement impressionné sur le disque, qui porte deux tubercules ou granules lisses, les côtés plus fortement arrondis avec les angles antérieurs et les élytres plus courtes, ponctuées de même; les yeux sont bien plus écartés, les antennes plus grêles, plus courtes, plus roussâtres, tandis que les pattes sont concolores. — Ankarahitra, Soalala (*H. Perrier*).

Aliturus fuscus. — Long. 14 mill. — Ressemble beaucoup à l'*A. gracilipes* ♀ Fairm. (Ann. Fr., 1903, 251), en diffère par la coloration d'un brun noirâtre avec une pubescence très fine, cendrée, plus dense sur la tête et le corselet, celui-ci un peu plus long, atténué peu à peu dès la base, à côtés droits, sans renflement, les élytres plus angulées aux épaules, un peu déhiscentes à l'extrémité, ayant chacune deux fines nervures, l'externe partant de l'épaule et se dirigeant vers l'extrémité de la suture, qui est un peu déprimée, l'interne peu distincte et plus courte; la convexité autour de l'écusson est aussi moins marquée; le dessous du corps est concolore, ainsi que les pattes, densément pubescent, les trochanters postérieurs sont roussâtres, les hanches également très saillants. — Région de l'Androy, Ambovombé (*D^r Decorse*).

L'*A. griseopubens* Fairm., qui se rapproche du *fuscus* par la coloration, quoique moins foncée, et par la forme du corselet, en diffère par les élytres sans nervures; c'est du reste un ♂, et le *fuscus* n'est décrit que sur une ♀.

Anisogaster brunneus. — Long. 7 mill. — Elongatus, parum convexus, piceo-brunneus, vix nitidulus, subtiliter griseo-pubescentibus; capite brevi, antice truncatulo, antennis gracilibus, articulo 1^o paulo claviformi, 3^o æquali, 4^o brevi; prothorace breviter ovato, elytris angustiore, antice et postice æqualiter parum angustato, dorso inæquali, antice arcuato, basi anguste marginato; elytris elongatis, angustis, parallelis, ad humeros angulatis, apice obtuse

rotundatis, basi prope scutellum leviter gibbosulis, dorso subtilissime alutaceis, sublus concolor, segmento ventrali 1^o magno, ultimis brevibus, ferrugineis, villosis, pedibus gracilibus, sat elongatis, femoribus clavatis, basi gracilibus et rufescentibus. — Soalala (*H. Perrier*).

Reconnaissable à sa forme étroite, allongée, sa petite tête et ses petits yeux.

SAGRIDOLA ARMIVENTRIS Fairm., Ann. Belg., 1903, 370.

Cette belle espèce n'avait été décrite que sur un seul individu de Diégo-Suarez; un second vient de m'être envoyé par mon ami, M. Perrier de la Battrie, qui l'a trouvé aux environs de Soalala. Cet individu porte la même armature métasternale, qui est si remarquable.

Artelida caligata. — Long. 12 mill. — Ressemble extrêmement à l'*A. remipes* Fairm., également noire, mais un peu blenâtre en dessous, avec les élytres rousses, mais ayant la suture et le bord marginal étroitement noirs; les pattes ont la même coloration, les fémurs postérieurs étant roux à la base, les tibias dilatés et colorés de même; la tête est à peine prolongée en avant; le chaperon, avec la bouche et les palpes, est roux, les antennes aussi; le corselet est un peu plus étroit, bien moins angulé sur les côtés; les élytres sont plus étroites, moins atténuées vers l'extrémité qui est un peu tronquée, et présentent une faible dépression longitudinale qui part de l'épaule et s'efface avant l'extrémité. — Madagascar; donné obligeamment par M. le Dr Mélichor.

Icariotis alboscutata. — Long. 6 mill. — Oblonga, modice convexa, piceo-fusca, vix nitidula, subtiliter griseo-pubescens, elytris lutoso-fulvis, extus, præsertim ad humeros paulo fumatis, extus anguste griseo-marginatis; capite rufescente, oculis convexis, antennis gracilibus, fulvo-piceis; prothorace elytris valde angustiore, longitudine parum latiore, antice a medio angustato, lateribus medio breviter sat acute angulatis, dorso subtiliter coriaceo, medio paulo rufescente; scutello ovato, albo; elytris ad humeros fortiter angulatis; basi planiusculis, postice sat convexis, haud angustatis, subtilissime dense coriaceis, circa scutellum leviter fumatis; subtus fulvo-lutosa, pilis griseis, in pectore densius vestita, pedibus sat elongatis, piceo, rufescentibus. — Soalala (*H. Perrier*).

Voisin du *basipennis* Fairm., mais d'une coloration différente.

Sternotomis euchroma. — Long. 13 mill. — Oblonga, indumento dilute rufulo dense vestita, maculis numerosis pallide cinereis, margine nigro anguste cinctis variegata; capite rufulo,

fronte cinerea, medio nigro lineata; clypeo et ore nigro, antennis gracilibus, rufescentibus et cinereo pruinosis, articulo 3° quarto longiore; prothorace transverso, lateribus late angulato, vitta medio cinerea et nigro marginata, utrinque vitta cinerea haud marginata; elytris vittula suturali cinerea, ad scutellum dilatata et marginata, apice dilatata, sed non marginata, utrinque maculis plurimis regularibus valde dentatis, nigro marginatis; subtus cinerea, vage cervino maculosa, pedibus rufescentibus, cinereo pruinosis. — Soalala (*H. Perrier*); un seul individu.

Cet élégant insecte diffère des *Sternotomis* par le prosternum bien plus étroit, les épaules simples, sans crêtes, et le 1^{er} article des antennes plus grêle.

Mimocoptops bipenicillatus. — Long. 7 mill. — Oblongovatus, postice attenuatus, modice convexus, indumento pubescente cinereo dense vestitus, elytris utrinque basi tuberculo dense nigro-pilosis instructis, fasciola sub humerum, fasciola fere mediana, et fasciola post medium transversis nigris, paulo elevatis, antice macula rufa comitatis, tuberculis anticis fere rufo circumcinctis, intervallis punctis nigris et pilis erectis laxè sparsutis, scutello rufo, prothorace rufo maculoso, capito summo et antice rufo lineolato, antennis fuscis, gracilibus, articulo 1° crasso, griseo-pubescente; prothorace transverso, elytris angustiore, basi et antice fere æquilato, lateribus medio dilatato et fortiter angulato, dorso inæquali, medio fere bigibboso, basi utrinque impressiusculo; elytris ad humeros sat rotundatis, dein gradatim attenuatis, basi granulatis et utrinque tuberosis, vage lineato-punctatis; subtus cum pedibus concolor, his sat validis, pilosis, piceo et griseo maculatis. — Soalala (*H. Perrier*).

Diffère du *M. fulvosparvus* Fairm. par sa forme plus courte, plus atténuée en arrière, les dents du corselet moins épineuses et les élytres ayant deux gros tubercules velus à leur base, le reste de leur surface bien moins inégal.

LENTALIUS n. g.

Genre voisin des *Lasiocercis*, dont il offre le facies; mais la tête est assez différente; elle est aussi fortement infléchie, mais l'insertion des antennes est bien plus rapprochée, le front plus étroit, sillonné au milieu; les antennes sont assez épaisses, n'atteignant pas tout à fait l'extrémité des élytres, le 1^{er} article un peu prismatique, pas beaucoup plus épais que le 3°, celui-ci plus long que le 4°, et tous cylindriques, de même épaisseur; le corselet est également armé d'une dent latérale, mais plus spiniforme et moins

rapprochée de la base; les élytres sont également assez courtes, renflées à la base de chaque côté de l'écusson, avec les épaules anguleusement saillantes; les pattes sont un peu moins courtes, plus grêles, les fémurs nullement claviformes, un peu comprimés; enfin le chaperon est sinué en avant et le labre plus grand.

Lentalius obliquepictus. — Long. 11 mill. — Oblongo-ovatus, modice convexus, piceus, indumento cinereo vestitus, lineolis nigris obliquis et maculis lacteis variegatus; capite griseo, lituris piceis variegato, medio sulcato et utrinque oblonge plicato, antennis cinereis, articulis apice vage griseis; prothorace transverso, elytris angustiore, utrinque dentato, dorso utrinque vittulis piceis obliquis et basi lineis 2 lacteis brevibus signato; margine postico fere recto, angulis acute rectis; scutello piceo; elytris ad humeros angulatim productis, medio baseos elevatis, utrinque lineolis et vittulis piceis oblique signatis, macula communi post medium, antice et postice lacerata, utrinque lineola fracta fere comitata et antice punctulis 2 lacteis, linea submarginali usque ad apicem producta, subtus grisescens, abdomine piceo fasciato, pedibus griseis, parum robustis, tibiis apice nigro maculatis, antennarum articulo ultimo apice nigro. — Région de l'Androy, Ambovombé (*D^r Decorse*); coll. du Muséum.

Cet élégant insecte est remarquable par les dessins obliques du corselet et des élytres.

Crossotus hovanus. — Long. 9 mill. — Sat brevis, piceus, pube tenui cinerascens paulo velutina vestitus, prothoracis lateribus late albis, scutello medio albo, elytris paulo post medium utrinque fascia diffusa, dilacerata alba, ad marginem magis condensata signatis, antennis albo breviter annulatis; capite inter oculos griseo transversim vittulato, antennis corporis dimidium haud superantibus, articulo 1^o valde incrassato; prothorace utrinque late et fortiter dentato, disco medio tuberculis 2 denudatis ornato; elytris parum fortiter, lateribus fere obsolete punctatis, basi utrinque striga brevi albida et prope scutellum tuberculo nigro nudo signatis; subtus cum pedibus concolor. — Région de l'Androy, Ambovombé (*Decorse*); coll. du Muséum.

Ressemble extrêmement au *C. collaris* Chev., du Gabon, mais d'une coloration assez différente, les élytres plus unicolores, non parsemées de taches roussâtres, bien moins ponctuées; le corselet porte sur le disque deux tubercules et l'écusson a une ligne médiane blanche au lieu d'une bordure.

Nicarete albolineatus — Long. 14 mill. — Elongatus, piceus, pube tenui cinerea dense vestitus, capite linea media,

prothorace lineis 4 albis elytris macula mediano-externa obliqua, suturam haud attingente, antice linea alba oblique marginato ornatis; antennis dense ciliatis, apice fuscis, elytris paulo longioribus; prothorace angusto, quadrato, lateribus parallelis; elytris postice gradatim attenuatis, apice oblique truncatis, post medium utrinque granis 3 signatis; subtus cum pedibus concolor, segmentis ventralibus pallidius apice marginatis, ultimo apice cum pygidio nigro. — Région de l'Androy, Androvombé (*Decorse*); coll. du Muséum.

Se rapproche de *N. Perrieri* Fairm. (Ann. Ent. Belg., 1898, 422) par les granulations de la partie postérieure des élytres, mais se distingue par la forme plus étroite, les lignes blanches de la tête et du corselet et par la tache des élytres nettement limitée en avant par une ligne blanche.

Nicarete vitticollis. — Long. 9 mill. — Ressemble assez à *l'albolineatus* pour l'ensemble de la coloration, mais bien plus petit, la tête n'ayant au milieu qu'une ligne plus claire, le corselet trois lignes blanches, l'écusson blanchâtre, les élytres ayant au milieu du bord marginal une tache brunâtre fortement angulée, en V renversé, ayant en avant une bande blanche marginale qui remonte vers l'épaule, et en arrière quelques petites nodosités; il y a aussi, vers la base, un petit trait obliquement transversal, un peu brunâtre, se terminant à une petite tache blanche, peu marquée, sur la suture; l'extrémité des élytres est presque arrondie; le dessous et les pattes sont couverts d'une fine pubescence un peu roussâtre. — Région de l'Androy, Ambovombé (*Decorse*); coll. du Muséum.

Nicarete submaculosus. — Long. 8 mill. — Un peu plus petit que le précédent; le corselet et la moitié postérieure des élytres sont d'un gris blanchâtre, la partie antérieure est brunâtre avec quelques petits points blancs vers la base et une tache externe roussâtre, la partie apicale est un peu rembrunie par des macules obscures avec l'extrémité un peu roussâtre et arrondie. — Même localité; coll. du Muséum.

G. OMPHALACRA Fairm. (Ann. Ent. Belg., 1896, 393).

Ce genre doit être réuni au *g. Nicarete*; l'unique espèce est voisine de *submaculosus*, avec un corselet plus étroit, plus long, les élytres alternativement noirâtres et grisâtres et les antennes plus densément velues.

Hoplorama Perrieri. — Long. 12 mill. — Oblonga, picea, obscuro-cinerea mixta, lateribus prothoracis cum dentibus et linea media pallidis, elytris plaga magna communi albida extus longiore,

macula picea marginali ornatis, apice grisescentibus, punctulis piceis laxè sparsutis; capite summo paulo grisescente, inter oculos transversim impresso, antennis piceis, gracilibus, corpore haud longioribus, articulo 1° cinereo, piceo punctato; prothorace transverso, utrinque late et fortiter dentato, basi transversim impressiusculo, angulis rectis; elytris ad humeros angulatis, dein parum attenuatis, apice oblique truncatulis, sutura vix elevata et utrinque costa tenui sat elevata, ab humero incipiente, per discum directa, ante apicem abbreviata, undique laxè punctatis, basi densius et rugose, utrinque tuberculo ovato, piceo, lævi ornatis; subtus cum pedibus dilute piceola, griseo tincta. — Ambongo (H. Perrier); un seul individu.

Plus grand et plus robuste que *quadricristata* Fairm. (Ann. Belg., 1896, 289), à peine atténué en arrière, avec le 1^{er} article des antennes plus cylindrique, les angles latéraux du corselet plus larges et plus saillants, les élytres ayant à la base un simple tubercule ovalaire, leur extrémité moins fortement tronquée, leur disque parcouru par une fine côte largement piquetée de brun comme la suture et le bord marginal et le 1^{er} article des tarses blanchâtre.

Cædomæa Blucheaui. — Long. 23 mill. — Oblonga, sat crassa, indumento lutoso-rufescens dense vestita, elytris vitta marginali mediana, post medium vittula valde interrupta, punctulisque aliquot antice et postice albis; capite lato, rugosulo, tuberculis antenniferis sat elevatis, antennis sat gracilibus, corpore haud longioribus, articulo 1° crasso, subprismatico; prothorace transverso, rugoso, lateribus ante medium breviter dentato et antice leviter tuberoso; elytris ad humeros angulatis, ante apicem tantum attenuatis, apice sat rotundatis, dorso irregulariter punctatis, basi granulatis, ad humeros fortius, tuberculo basali similiter granato; subtus cum pedibus rugosula, his brevibus, sat validis. — Farafangana; donné par M. Blucheau, lazarisiste.

Plus massive et moins parallèle que ses congénères, couverte d'un enduit serré d'un roussâtre rubigineux, avec une courte bande marginale blanche au milieu du bord des élytres et une bande transversale formée de taches plus ou moins confluentes.

Cædomæa nebulosa. — Long. 10 à 12 mill. — Ressemble assez à *C. apicepicta* Fairm. (Rev. d'Ent., 1901, 223), mais plus grande, couverte d'un enduit cendré plus clair, les élytres ayant chacune trois taches mal arrêtées, brunâtres, piquetées de petites taches brunes, l'une à la base, l'autre au milieu, la 3^e apicale, les espaces piquetés de brunâtre; la tête est large, courte, blanchâtre en devant, sillonnée au milieu, avec les saillies antennaires bien

marquées, ainsi que deux petits reliefs sur le front; les antennes n'atteignent pas l'extrémité des élytres, elles sont cendrées, piquetées de brun; le corselet est presque carré, plus étroit que les élytres, faiblement rétréci tout à fait à la base, légèrement impressionné transversalement en avant, plus fortement à la base, la surface un peu inégale, ruguleuse, à ponctuation forte, peu serrée, faiblement impressionnée longitudinalement au milieu, ayant de chaque côté un petit relief roussâtre peu saillant; les élytres sont un peu inégales, granuleuses, plus fortement à la base et sur les côtés; le dessous du corps et les pattes sont piquetés de brun. — Androy, région du Mandaré (*Decorse*); collection du Muséum.

Cædomæa griseotincta. — Long. 8 à 10 mill. — Ressemble beaucoup à la *C. semiluctuosa* Fairm. (Rev. d'Ent., 1901, 228), mais notablement plus petite, d'une coloration peu différente, également grisâtre, avec le corselet plus brun à la base, devenant blanchâtre en avant, ayant un trait blanc au milieu de la base, l'écusson plus court, blanc, avec un trait médian noir; les élytres ont une bande basilaire noirâtre courte, assez bien limitée, rejoignant par le bord externe une tache brune plus ou moins triangulaire dont la pointe ne dépasse guère le milieu du disque, une tache brunâtre vague avant l'extrémité; la tête est brune, avec quelques taches pâles, un peu roussâtre en avant; le bord antérieur du corselet est finement denticulé, la partie basilaire est rugueusement ponctuée, la ligne blanche se termine en avant par un point brun; les élytres sont plus courtes, bien moins ponctuées, surtout à la base. — Région de l'Androy (*Decorse*); coll. du Muséum.

Diadelia atomosparsa. — Long. 14 mill. — Ressemble à *D. bifasciata* Wat. pour la forme générale, la taille et la coloration, mais plus large, plus robuste, moins atténuée en arrière, d'un gris cendré plus pâle, parsemée de petits points bruns, nombreux, les élytres ayant chacune une petite tache brune sur le disque après le milieu; le corselet est parsemé de fines granulations noires écartées et présente deux faibles renflements de chaque côté du disque; les élytres sont un peu granuleuses à la base, le reste présente des granulations plus fines, très écartées; la suture et deux lignes de chaque côté légèrement convexes; l'extrémité est tronquée obliquement avec l'angle externe bien marqué; le dessous du corps et les pattes sont également ponctués d'un brunâtre pâle. — Région de l'Androy, Ambovombé (*D^r Decorse*); coll. du Muséum.

Praonetha fuscopunctata. — Long. 8 mill. — Oblonga, griseo-cervina, punctis fuscis sparsuta, elytris fasciis 3 fumatis

ornatis, 1^a basali majore, 2^a fere mediana et 3^a anteapicali obliquis, fumatis, scutello nigrovelutino; antennis corpore parum longioribus, fuscis, gracilibus, articulo 1^o crasso, ceteris basi leviter pallidis; prothorace transverso, convexo, lævi, lateribus breviter dentato; scutello sat lato; elytris a basi leviter attenuatis apice paulo oblique truncatulis, angulis paulo obtusis, dorso subtilissime striatulis, stria suturali apice tantum impressa, interstriis planiusculis; subtus obscurior, punctis fuscis sparsuta, abdomine apice pallidiore. — Soalala (*H. Perrier*).

Ressemble beaucoup à *P. vagefasciata* Fairm. (Ann. Fr., 1902, 388), mais un peu plus grande et plus atténuée en arrière, avec le corselet un peu plus large, plus convexe, uni, ayant de chaque côté une petite pointe conique, sans impression à la base, l'écusson large et les élytres à stries indistinctes, parsemées de petits points noirs granuleux.

Praonetha hispina. — Long. 6 1/2 mill. — Ressemble extrêmement à *P. lineigera* Fairm. (Ann. Ent. Fr., 1899, 120), en diffère par la taille plus faible, le corps plus étroit, les bandes plus nettes, les côtes plus saillantes et par l'extrémité des élytres, qui sont obliquement tronquées avec l'angle externe épineux; la tête est assez petite, ponctuée d'un gris roussâtre, avec deux bandes noirâtres; les antennes sont d'un brun de poix; le corselet a la même forme et la même coloration; les élytres sont d'un fauve roussâtre avec une tache basilaire commune brune; les côtes sont plus régulières, piquetées de brun; les intervalles sont plus densément ponctués, plus fortement à la base, et l'extrémité externe est épineuse; le dessous et les pattes sont bien moins foncés. — Soalala (*H. Perrier*).

CHRYSOMELIDÆ

Lema crispatifrons. — Long. 6 mill. — Oblonga, sat convexa, supra rufa, modice nitida, subtus fusco-cœrulescens, parum nitida, abdomine lateribus rufo anguste marginato, antennis pedibusque nigris; capite obscuriore, antice infuscato, multi impresso et paulo plicatulo, oculis summo sat approximatis, antennis validis, apicem versus leviter crassioribus, articulis subæqualibus; prothorace longitudine vix latiore, medio utrinque profunde constricto et supra transversim impresso; parte antica paulo inæquali, lateribus anguloso-ampliata, parte basali transversim sulcatula et basi dilatata; elytris oblongis, postice haud sensim ampliatis, fortiter lineato-punctatis, lineis apice substriatis, punctis basi majoribus; humeris convexis; subtus lateribus punctulata, abdomine lateribus

impressiusculo; pedibus subtiliter griseo-pilosulis. — Diégo-Suarez; donné par M. Xambeu.

Ressemble à la *curtula* Fairm. (Rev. d'Ent., 1903, 45), mais la sculpture de la tête est bien différente, les antennes sont un peu moins longues mais plus épaisses, le corselet est moins court, plus fortement étranglé, les élytres sont plus longues, plus fortement ponctuées, avec une très faible teinte bronzée.

Crioceris discoidalis. — Long. 4 mill. — Parum oblonga, sat convexa, rufa, vix nitidula, elytris plaga magna fusca, communi, marginis nec basin attingente signatis; capite inter oculos vix impressiusculo, his convexis, valde exsertis, antennis brevibus, apice nigro-clavatis; prothorace brevi, capite vix angustiore, rugosulo-punctato, ante basin constricto et transversim fortiter sulcato, in pleuris profunde impresso, angulis anticis acutis; elytris ad humeros angulato-rotundatis, modice striatis, striis fortiter punctatis, dorso post basin transversim fortiter impressis, interstriis modice convexis, lævibus; subtus nigra, pedibus flavidis, femoribus sat validis. — Soalala (*H. Perrier*).

Remarquable par sa coloration, la forte ponctuation du corselet et des élytres et la brièveté des antennes qui sont claviformes.

Crioceris dilutipes. — Long. 4 mill. — Forme de la *discoidalis* avec une sculpture analogue, mais d'une coloration très différente, d'un brun très faiblement bronzé, médiocrement brillant, avec les pattes d'un jaunâtre pâle; la tête est plus étroite, portée sur un col distinct, avec les yeux également saillants en dehors; la tête est plus déprimée et plissée entre les yeux; les antennes, moins courtes, sont d'un roussâtre obscur avec les articles 8-10 plus foncés, et le 11^e plus pâle; le corselet est un peu transversal, assez fortement rétréci avant la base et légèrement striolé à la base, les angles postérieurs fortement angulés, le dos ruguleusement ponctué; les élytres ont la même forme, mais les stries sont peu marquées, plus grossièrement et moins régulièrement ponctuées, devenant un peu sillonnées à l'extrémité; le dessous est également noir, avec une fine pubescence d'un blanc soyeux sur les flancs. — Soalala (*H. Perrier*).

Crioceris fusco-picta. — Long. 2 3/4 à 3 mill. — Parum oblonga, convexa, capite prothoraceque rufis, nitidis, elytris dilute flavidis, nitidis nigro maculatis, fere transversim trivittatis, vittis interruptis, maculis ad humeros et scutellum nigris, hac per suturam prolongata, sutura ipsa nigra, subtus nigra, pectoris lateribus pallido-puberulis; pedibus dilute flavidis; capite brevi; ante oculos utrinque foveolato, his valde exsertis, antennis sat gracilibus, apicem versus vix crassioribus, dilute flavidis, basi et apice fuscis,

articulo ultimo excepto; prothorace angusto, parum convexo, ante basin paulo constricto et transversim fortiter sulcato, pleuris impressis, dorso convexo, sat fortiter punctato et paulo rugosulo, angulis anticis acutiusculis; elytris sat brevibus, striato-punctatis, striis prope suturam fortius punctatis, extus et apice minus, post scutellum transversim fortiter impressis; pedibus validis. — *Soalala* (*H. Perrier*).

Les élytres ont à la base une forte impression transversale commune qui détermine une faible bossette de chaque côté de l'écusson.

Un individu de 3 mill. a les dessins noirs des élytres presque effacés; les antennes sont unicolores, le corselet assez fortement sillonné en travers à la base; je crois que c'est une ♀.

Crioceris semirufa. — Long. 6 mill. — Oblonga, dorso planiuscula, rufocastanea, nitida, elytris flavis, utrinque vittis 2 nigris, apice confluentibus, externa marginem fere attingente, prothorace utrinque macula pleurali nigra signato, pectoris lateribus nigris, antennis piceis; capite brevi, summo transversim sulcatulo, inter oculos impressiusculo, his exsertis, globosis; antennis brevibus, crassis, apicem versus crassioribus, fere clavatis; prothorace vix transverso, elytris angustiore, postice breviter angustato et transversim fortiter sulcato; elytris dorso planiusculis; fortiter lineato-punctatis, apice extremo substriatis, postice levissime ampliatis; subtus lævis, metapleuris vix punctulatis, pedibus piceo-castaneis. — *Soalala* (*H. Perrier*).

Forme et coloration de la *campestris*, mais plus grande et moins déprimée; le corselet est plus large, plus arrondi sur les côtés, un peu rétréci et sillonné à la base; la tête et le corselet sont rougeâtres et les élytres sont plus grossièrement ponctuées. Ressemble à la *latevittata* Fairm. (Ann. Soc. Belg., 1902, 258), mais moins convexe, avec le corselet sans taches, les antennes entièrement noires, épaissies vers l'extrémité, et les élytres assez fortement ponctuées, à bordure marginale entière.

Sybriacus picipes. — Long. 8 mill. — Ovatus, convexus, viridi-metallicus, leviter cœrulescens, valde nitidus, pedibus piceo-rufis, femoribus dilutioribus; capite dense punctato, clypeo late fortiter emarginato, antennis fuscis, articulo 1^o rufo; prothorace elytris angustiore, antice angustato, lateribus rotundato, sat dense punctulato, lateribus fortius ac densius, medio longitudinaliter læviore; scutello plano, lævi; elytris ovalis, postice haud ampliatis, punctato-lineatis fere striatulis, intervallis planis, 3^o et 5^o medio magis laminatis, punctis basi majoribus, humeris intus fortiter

sulcatis, nitidis, paulo aurosis; margine externo magis cœrulescente; subtus piceo-ænescens, parum nitidus, pedibus sat validis, femoribus anticis crassioribus, subtus fere angulosus et denticulo minutissimo munitis, tibiis intermediis apice extus late sinuatis, pubescentibus, apice extus productis, tarsis latis. — Soalala (*H. Perrier*); un seul individu.

Ressemble au *viridimicans* Fairm., mais un peu plus petit et plus bleuâtre avec des pattes rougeâtres; la ponctuation du corselet est plus dense, moins lisse au milieu; la ponctuation des élytres est plus régulière, plus en stries, les intervalles bien moins ponctués, avec l'impression basilaire à peine marquée, et le 1^{er} article des antennes est roux; les tibias intermédiaires ont la même sculpture.

Cryptocephalus nigrosparsus. — Long. 4 1/2 mill. — Ovatus, convexus, niger, supra flavus, nitidus, capite puncto verticali et puncto epistomali, prothorace maculis plurimis, medianis majoribus et paulo confluentibus, elytris linea marginali et suturali tenui, et utrinque, maculis 4 nigris ornatis, abdomine lateribus supra flavomarginato, pedibus flavis, nigro maculatis; capite vix punctulato, oculis sat distantibus, antennis breviusculis flavis, apice nigris; scutello lævi, antice angustato, margine postico medio haud lobato, ante angulos sinuato, his magis quam rectis; scutello scutiformi, apice haud elevato; elytris subquadratis, postice attenuatis, apice valde rotundatis, dorso lineato-punctatis; subtus cum pedibus subtiliter punctulatus, his sat brevibus, validis, segmento ventrali ultimo punctato, medio foveato, apice flavo-marginato. — Soalala (*H. Perrier*).

Cet insecte est facile à reconnaître à sa coloration qui rappelle un peu celle du *bistripunctatus* et dont il se rapproche par son écusson non rétréci vers l'extrémité et ses élytres à peine sinuées au bord externe.

Cryptocephalus nigrotibialis. — Long. 5 mill. — Paulo oblongus, subcylindricus, rufus, nitidus, tibiis, tarsis antennisque (articulo 1^o exeplo) nigris; capite leviter biimpresso, antennis gracilibus, apice haud crassioribus; prothorace antice attenuato, lateribus fere rectis, dorso lævi, margine postico medio lobato-truncato; scutello lævi; elytris leviter striatulis, striis valde crenato-punctatis, intervallis disco paulo plicatulis, 2^o et 4^o ante apicem conjunctis et plagulam lævem efficientibus; subtus minus nitidus, punctatus. — Diégo-Suarez; coll. Donckier.

Ressemble beaucoup à l'*oblongulus* Fairm., mais, outre la taille, la coloration des pattes et la sculpture des élytres sont fort différentes.

Cryptocephalus impressidorsis. — Long. 3 à 4 mill. — Ovalis, castaneo-piceus aut rufo-castaneus, nitidus; capite sat late impresso; prothorace antice attenuato, lateribus fere rectis margine postico medio lobato; elytris lineato-punctatis, punctis post medium obsolescentibus, dorso ante medium impressione arcuato, versus humeros adscendente signato, sutura ad scutellum depressa; tarsis fuscis. — Diégo-Suarez; coll. Donckier.

Ressemble beaucoup au *nigrotibialis*, mais plus petit, d'une coloration plus foncée, avec les élytres plus courtes, à lignes faiblement ponctuées, s'effaçant après le milieu et les tarses seuls noirs.

Des individus provenant de l'Androy ont les pattes rousses, sauf les tarses; mais on trouve des pattes un peu roussâtres chez quelques individus du nord de l'île.

Cryptocephalus multinotatus. — Long. 4 mill. — Ovatus, flavorufus, parum nitidus, maculis nigris numerosis ornatus, capite summo nigricante, prothoracis vitta media et utrinque lituris aliquot, scutello, elytris utrinque macula humerali et macula basali, et postice vittulis 2 vel 3 brevibus, antice et postice fere conjunctis nigris, subtus cum pygidio niger, pube albida dense vestitus, pedibus rufis, femoribus fusculo maculatis; capite medio impresso, oculis sat approximatis, prothorace antice sat fortiter angustato, lateribus leviter arcuatis, punctis piceis sparsuto, margine postico medio parum lobato; elytris subquadratis, fortiter striatulo-punctatis, basi fortius, intervallis convexis, lævibus, punctis postice haud oblitteratis; pygidio apice cum ano rufescente, pedibus brevibus. — Région de l'Androy, Ambovombo (*Decorse*); coll. Donckier.

Ressemble au *scripticollis* pour la forme, mais la coloration et surtout la sculpture sont fort différentes.

Cryptocephalus anticus. — Long. 4 1/2 mill. — Subquadratus, rufus, nitidus, capite et macula magna prothoracis, partem anticam occupante nigrofuscis; capite punctulato, antice læviore et nitidior, clypeo fortiter sinuato, antennis gracilibus, rufis; prothorace lato, brevi, antice valde angustato, dorso fere lævi, margine postico medio late lobato; scutello lævi, sat lato; elytris brevibus, fortiter striato-punctatis, punctis postice haud minoribus, humeris lævibus; tarsis fuscis. — Baie d'Antongil; coll. Donckier.

Remarquable par sa forme courte, ses élytres fortement striées-ponctuées, la tache noire antérieure du corselet s'étendant sur la tête et les tarses noirâtres; les yeux sont grands et un peu rapprochés.

Cryptocephalus piceorufus. — Long. 5 1/2 mill. — Ressemble à l'*ebenus* pour la forme et les impressions des élytres, mais un peu plus grand, plus oblong, d'un roux brunâtre brillant, avec la poitrine plus foncée, ainsi que les tarses et le sommet de la tête; celle-ci est unie, un peu impressionnée au sommet; le 1^{er} article des antennes roux; le corselet est plus large, plus ample, avec les côtés arqués, le milieu du bord postérieur bien lobé, à peine impressionné de chaque côté; les élytres ont des lignes ponctuées très fines, une impression peu marquée sur le disque, une autre moins distincte près du milieu de la suture; elles ont aussi les épaules fortement marquées d'un sillon arqué en dedans, mais il n'y a pas d'impression marginale après l'épaule; le pygidium et le dessous du corps sont finement pubescents. — Diégo-Suarez; coll. Donckier.

Cryptocephalus scripticollis. — Long. 4 mill. — Ovatus, valde convexus, postice levissime attenuatus, ochraceo-flavus, modice nitidus, nigro-variegatus, capite maculis plurimis et ore, prothorace vittis 4 paulo obliquatis, marginem anticum haud attingentibus, et vittula brevi discoidali, elytris linea suturali angusta et utrinque punctis 4, 1^o humerali, 2 discoidalibus et 4^o ante scutellum sutura adjuncto, scutello nigro; subtus cum pedibus niger; capite planato, oculis sat distantibus, late sinuatis, antennis basi flavis; prothorace lævi, a basi attenuato, lateribus vix arcuatis; margine postico medio haud lobato, ante angulos sinuato; scutello lævi; elytris tenuiter punctulato-lineolatis, intervallis planis, margine externo tenuissime nigro; pygidio rugoso-punctato, plaga flava lævi transversim signato. — Plateau de l'Androy; coll. Donckier.

Voisin du *fractesciptus* Fairm., mais plus court et d'un dessin très différent.

Cryptocephalus anthrax. — Long. 6 à 7 mill. — Ressemble à l'*ebenus* Fairm., mais plus grand, plus massif, d'un noir brillant, mais légèrement bleuâtre; la tête est finement ponctuée, un peu impressionnée au milieu, les yeux médiocrement distants; le corselet a la même forme, mais plus large, formant aussi, vis-à-vis de l'écusson, un lobe saillant, un peu comprimé; les élytres sont plus carrées, à lignes finement ponctuées, mais distinctes, également un peu impressionnées sur la suture, mais sans fossette discoïdale; le pygidium est densément et uniformément ponctué, couvert de poils sétacés d'un blanc soyeux. — Diégo-Suarez; coll. Donckier.

Cryptocephalus læsicollis. — Long. 3 mill. — Ovatus, convexus, castaneus, nitidus, elytris nigris, utrinque plaga magna

flavida, mediana, marginem externum, sed non suturam attingente ornatis, subtus cum pedibus niger, opaculus; prothorace subconico, valde convexo, paulo compressiusculo, polito, margine postico ad scutellum valde lobato et utrinque oblique fortiter impresso; elytris subquadratis, postice vix attenuatis, fortiter punctato-striatis, intervallis convexis, lævibus, punctis basi majoribus; propygidio et pygidio valde punctatis, illo vitta albo sericea transversim ornato. — Baie d'Antongil; coll. Donckier.

Remarquable par les deux grandes taches jaunes des élytres et les deux fortes impressions obliques du corselet au milieu du bord postérieur.

Cryptocephalus diversipes. — Long. 6 1/2 mill. — Ressemble beaucoup à l'*ebenus* Fairm., également d'un noir brillant, mais avec la bouche, les antennes et les pattes d'un roussâtre clair; le corps est moins étroit, le corselet est semblablement lobé au milieu de la base, les élytres sont plus larges, à lignes ponctuées bien marquées, sans impressions sur le disque ni sur la suture; le pygidium est densément et assez finement ponctué, avec une petite strie médiane. — Baie d'Antongil; coll. Donckier.

Cryptocephalus cyaneocostatus. — Long. 4 mill. — Oblongus, sat angustus, castaneo-rufus, nitidus, elytris costulis cœruleis, apice rufis signatis, externis longius cœruleis; capite impressiusculo, obscuriore, antennis obscure rufis; prothorace fere conico, antice valde angustato, lateribus fere rectis, dorso lævi, margine postico medio late et sat fortiter lobato; scutello brevi, rufo; elytris prothorace fere latioribus, parallelis, costis sat latis, postice paulo oblitteratis, externis integris, lævibus, interstitiis biserialim fortiter punctatis, crenatis, callo humerali paulo auroso; subtus cum pedibus concolor. — Baie d'Antongil; coll. Donckier.

Ce Cryptocéphale a un facies assez différent de celui de ses congénères; le corps est étroit, parallèle, les élytres sont ornées de côtes assez larges, lisses, bleues, les internes s'effaçant à l'extrémité, les trois externes prolongées, formant une large bande bleue, ne laissant en dehors qu'une étroite bordure rousse.

Cryptocephalus nedator. — Long. 4 1/2 mill. — Ressemble bien au *semicyaneus* pour la forme et la coloration générale, s'en distingue par la taille plus faible, le corps plus court avec les pattes rousses ainsi que le dessous du corps, sauf les métapleures qui sont brunâtres et garnies d'une pubescence soyeuse, grise; en outre, le corselet est moins ample, impressionné au milieu de la base, la ponctuation des élytres est bien plus fine et forme de légères stries,

prolongées jusqu'à l'extrémité; enfin, la tête est de même couleur que le corselet. — Diégo-Suarez; coll. Donckier.

Cryptocephalus eucharis. — Long. 1 $\frac{4}{5}$ mill. — Oblongo-ovatus, sat convexus, rufus, nitidus, capite summo rufo, prothorace obscure rufo, maculis 2 basalibus flavis notato, elytris flavis, margine laterali et vittula suturali ante et post medium dilatata piceolorufis; oculis magnis, supra approximatis, antennis gracilibus, dilute fulvis, apice infuscatis; prothorace transverso, dense sat fortiter punctato, basi elytris haud angustiore, antice parum attenuato; scutello sat brevi, fusco, nitido, haud oblique elevato, elytris fortiter punctato-striatis, intervallis convexis, fere costatis, pygidio rufo, plano, punctulato, marginibus elevatis; subtus rufus, punctulatus, pedibus dilute rufis sat brevibus. — Soalala (*H. Perrier*).

Ce joli Cryptocéphale est remarquable par la sculpture des élytres, à stries ponctuées assez profondes avec des intervalles costiformes; l'écusson est plan, le corselet à peine rétréci en avant et presque rugueusement ponctué.

BRADAMINA n. g.

Ce nouveau genre me paraît se ranger avec les Monoleptides dont il se rapproche par la forme du corps, les antennes à 1^{er} article allongé, claviforme, les épipleures très courtes, peu marquées, les hanches antérieures contiguës, mais les tibias ne sont pas mucronés, le 1^{er} article des tarses est plus long que les autres réunis, le pénultième très large, un peu bilobé, les crochets petits, paraissant appendiculés. La tête forme un museau assez large et court, les yeux sont médiocres, les antennes dépassent le milieu du corps, assez grêles, le 3^e article deux fois aussi long que le 2^e, le 4^e égal au 3^e. Le corselet est rebordé latéralement, fortement plissé et impressionné à la base; les élytres sont de consistance assez molle, tronquées à l'extrémité et un peu impressionnées à la base.

Bradamina plicicollis. — Long. 5 mill. — Oblonga, convexiuscula, rufa, nitida, subtus cum pedibus nigra; capite obtuse rostriformi, inter oculos impressiusculo; antennis fuscis, corporis medium superantibus, sat gracilibus, articulo 1^o magno, rufo; prothorace transverso, elytris angustiore, antice et basi fere æquilato, lateribus vix arcuatis, dorso basi fortiter biimpresso, lateribus elevatis et intervallo medio convexo, utrinque iterum impresso, parte basali breviter fusca, angulis rectis; scutello variabili, rufo aut fusco, interdum convexo; elytris oblongis, apice oblique truncatis, basi ad humeros oblique et post scutellum transversim

impressis, dorso lævibus; subtus cum pedibus subtiliter cinereo-pubescentis. — *Ankarahitra* (*H. Perrier*).

TERPNOCHLORUS n. g.

Ce nouveau genre paraît voisin des *Antsianaka* Duv.; les antennes sont aussi insérées sur le front entre les yeux, qui sont gros et saillants, mais le 1^{er} article des antennes est plus court, bien clavi-forme; le labre est également développé, convexe; le corselet n'est pas rebordé, mais il est rugueusement ponctué ainsi que les élytres, celles-ci plus grossièrement et presque régulièrement, elles sont arrondies aux épaules, et non élargies en arrière; les pattes sont bien plus robustes, les fémurs postérieurs sont épais dans les deux sexes, mais les pattes ne semblent pas saltatoires; les tibias sont droits, inermes, s'élargissant un peu vers l'extrémité; les tarses larges, le 3^e plus fortement et bilobé, le 4^e grêle.

Le facies de cet insecte est assez curieux, à raison de la convexité des élytres, de leur forte sculpture et des yeux qui sont très convexes et débordent le corselet.

Terpnochlorus Perrieri. — Long. 2 à 3 mill. — Sat gracilis, convexus, virescens aut cupreolus, metallicus, nitidus, rugose punctatus; capite subtiliter punctato, oculis globosis, antennis gracilibus, fuscis, corpore paulo longioribus ♂, valde brevioribus ♀, articulo 1^o sat brevi, paulo crassiore, 3^o quarto brevior; prothorace subquadrato, elytris angustior, lateribus haud marginato, vix rotundatis ♂, paulo magis ♀, subtiliis punctato; scutello parvo, transverso, fusco, lævi; elytris ovato-oblongis ad humeros anguloso-rotundatis, grosse seriato-punctatis, post scutellum transversim impressiusculis, apice obtuse rotundatis; subtus fusculo-aenescens, sat lævis, pedibus viridi-metallicis, fere lævibus; ♀ minor, brevior, antennis brevioribus, pedibus obscurioribus, tibiis basi interdum pallidis. — *Soalala* (*H. Perrier*).

Cœlenomenodera sculptipennis. — Long. 8 mill. — Oblonga, modice convexa, testaceo-flava, nitida, elytris et pectore (prosterno excepto), capite summo antennis et femoribus 4 posticis nigris; capite brevi, oculis prominulis, antennis brevibus, apice clavatis et cinereo-pubescentibus; prothorace elytris angustior, latitudine fere longior, antice supra caput producta, apice leviter emarginata et nigro notata, parte antica depressa, biimpressa, lateribus elevata, dorso basi 5-impresso, impressione media basali majore, impressionibus et lateribus laxè fortiter punctatis; scutello basi lato et dense flavido-pilosulo, apice nigro; elytris postice

levissime ampliatis, fortiter multi-impressis, impressionibus parce punctatis et marginibus cum sutura elevatis; pedibus validis, sat brevibus, tarsis latis, piceis. — Soalala (*H. Perrier*).

Bien distinct par sa forme plus courte, plus large et ses élytres couvertes de fortes impressions dont les intervalles sont relevés.

ASPIDOMORPHA ROTUNDA Fairm., Ann. Soc. Belg., 1897, 207.

Cette Casside paraît bien voisine de l'*A. pontifex* Boh.; mais cette dernière a l'écusson strié transversalement, tandis qu'il est très lisse chez la *rotunda*.

Trois larves de cette espèce m'ont été envoyées par M. Perrier de la Battrie; elles sont intéressantes, car les larves des Cassidides exotiques sont peu connues. Celles-ci se rapprochent de la larve de la *Porphyraspis palmarum* Boh. en ce qu'elles n'ont pas non plus d'appendice fourchu pour soutenir les filaments excrémentitiels; en outre, les segments prothoraciques ne sont pas plus larges que ceux de l'abdomen et le corps est garni sur tous les côtés de saillies dentiformes charnues, finement barbelées de soies pâles très fines, qui semblent destinées à supporter la masse des excréments. Ceux-ci sont d'un brun noir, très longs, ramassés sous le corps de la larve, mais ce n'est pas leur position normale. Ces larves sont longues de 10 mill., d'un fauve sale, rembruni vers les côtés et l'extrémité; le dessus est fortement plissé et l'anus fait saillie entre deux plis; le dessous du corps est plus pâle; les pattes sont indistinctes. Il est probable que ces larves se recouvrent de leurs excréments comme d'un bouclier ainsi que le font celles de la *Porphyraspis*.

Cassida exsanguis. — Long. 13 mill. — Brevissime ovata, subrotundata, supra dilute fulvo-flavicans, marginibus leviter viridulis, subtus cum pedibus rufescens, nitida; antennis crassiusculis, rufulis, articulo ultimo nigro, prothoraceis basin haud attingentibus; prothorace late arcuato, angulis posticis obtusiusculis, margine antico et laterali reticulato, disco antice leviter biimpressiusculo, margine postico medio breviter sublobato et truncato; scutello triangulari, læviusculo; elytris subrotundatis, subtiliter sat dense punctulatis, parte explanata sat lata, fortiter punctata, quasi reticulata; subtus nitidior, fuscule maculosa, abdomine transversim punctato, pedibus sat validis, tarsis latis. — Ankarahitra (*H. Perrier*).

Ressemble à la *cephæcolor* Fairm., mais plus grande, moins courte, plus verdâtre et couverte d'une ponctuation serrée, fine, mais bien distincte.

Cassida ovoidea. — Long. 6 mill. — Forme et coloration de la *depressa* Sulf., plus étroite et plus roussâtre; le corselet est plus rétréci en avant, les angles postérieurs sont à peine arrondis, le bord postérieur est aussi bisiné de chaque côté, l'écusson est moins court, moins déprimé; les élytres sont plus courtes, étroitement marginées, assez fortement impressionnées sur les côtés derrière les épaules, la ponctuation est également assez forte, avec deux faibles lignes élevées sur chacune, une ligne de gros points entre la partie marginée et le dos. — Mudivalo (*H. Perrier*); un seul individu.

Cassida plicatula. — Long. 9 mill. — Subrotundata, modice convexa, rufo-piceola, marginibus dilutioribus, nitida; prothorace brevi, elytris angustiore, levi, lateribus cum angulis posticis rotundato, medio baseos obsolete et utrinque sat late impresso, margine postico medio sat obtuse lobato; scutello depresso; elytris fere rotundatis, ad humeros angulatis, sat grosse et parum regulariter substriato-punctatis, pone scutellum paulo retusis, utrinque sat fortiter impressis et plicatis, dorso antice impressis et inaequalibus, postice minus fortiter et irregulariter punctatis, parte explanata sat dense punctata, a parte dorsali punctis grossis separata. — Diégo-Suarez; ma collection.

Ressemble à la *tricolorata* Fairm., mais plus grande, d'une coloration différente, plus fortement ponctuée et plus inégale sur les élytres.

Cassida rufomicans. — Long. 5 à 7 mill. — Subrotundata, sat convexa, rufo-ferruginea, nitida, marginibus dilutioribus, elytris impressionibus, plus minusve infuscatis, interdum fere unicoloribus, rarius extus fusco-subvittatis, intervallis angustis, interdum plus minusve metallico-micantibus; prothorace minus brevi, antice late rotundato, elytris vix angustiore, dorso subtiliter punctato, basi subtilissime dense strigosulo, margine antico paulo dilutiore, interdum utrinque obsolete impressiusculo, angulis posticis rotundatis, margine postico medio truncato-lobato, scutello fere triangulari, levi; elytris subrotundatis, lateribus oblique sat late explanatis, ad scutellum paulo retusis, impressis, impressione plicato-marginatis, dorso sat irregulariter grosse lineato-punctatis aut fere foveolatis, intervallis aliquot paulo subcostatis, parte explanata subtiliter punctata, intus linea fortius punctata limitata; subtus concolor, magis nitida, laevi. — Ankarahitra, Soalala (*H. Perrier*).

Var. *B* : elytris utrinque vitta lata nigricante medio sinuata ornatis.

Cette Casside rappelle un peu notre *C. nebulosa*, mais les élytres

ne sont pas tachetées, elles sont plus convexes, un peu rétuses derrière le corselet et plus largement marginées. La coloration est un peu variable d'intensité; les élytres ont, sur les côtés du dos, le plus souvent, une teinte plus ou moins rembrunie qui finit par former une assez large bande.

Cassida latecincta. — Long. 5 mill. — Subrotundata, supra fusca, nitida, elytris punctulis rufis, parce sparsuta, prothoracis et elytrorum marginibus late flavidis, corpore subtus cum pedibus antennisque flavidis; prothorace brevi, elytris haud angustiore, ruguloso et fortiter punctato, punctis oblongis, basi medio truncato-lobato et breviter flavido-marginato, parte explanata reticulata, utrinque basi et antice leviter impressis; scutello rufescente; elytris dorso valde rugatis, sutura et utrinque costulis 3 elevatis, parte antica oblique rétuse et summo transversim plicata, parte explanata reticulato-punctata; intervallis internis paulo nervulatis, humeris elevatis, lævibus. — Diégo-Suarez; donné par notre collègue, M. Xamheu.

Ressemble aux individus moyens de la *C. rufonitens*, mais un peu moins large, plus régulièrement convexe, avec le dos des élytres et le milieu basal du corselet d'un brun foncé, nettement dessiné, parsemé de quelques points roussâtres; la sculpture est plus fine, la partie rétuse est à peine indiquée, fortement rebordée en arrière, les lignes de points sont assez régulières et il y a une espèce de côte près de la suture; la partie brune du corselet est faiblement ponctuée.

Cassida lateritia. — Long. 4 à 5 mill. — Ressemble extrêmement à la précédente, mais notablement plus petite, d'une coloration un peu plus pâle, sans reflet métallique; la partie dorsale des élytres est presque toujours bordée par une bande brune, plus ou moins foncée, partant de l'écusson et allant jusqu'à la suture, émettant parfois au milieu une petite bande transversale peu régulière, ces bandes très variables et envahissant parfois tout le dos; le corselet est un peu moins large, également arrondi sur les côtés; les élytres sont bien moins inégales, les points sont plus fins, plus régulièrement en stries, les intervalles plus convexes. — Ankarahitra, Soalala (*H. Perrier*).

CASSIDA INCONSTANS Fairm., Ann. Soc. Fr., 1899, 506.

Plus petite que la précédente à qui elle ressemble beaucoup; le corselet est moins convexe, moins arrondi en avant, moins court; les élytres sont plus finement et plus régulièrement ponctuées en stries; presque toujours un assez gros point noir sur la suture après l'écusson; les côtés en dos sont à peine impressionnés derrière

l'épaule; les antennes dépassent un peu la base du corselet, ce qui m'avait fait ranger cette espèce avec les *Coptocycla*. Le dessous du corps est d'un brun foncé avec les côtés de l'abdomen roux.

Cassida lyricea. — Long. 5 mill. — Ressemble à la précédente par sa coloration d'un fauve jaunâtre, plus claire sur les bords, et par la bande latérale des élytres assez noire, mais plus étroite, fortement sinuée au milieu, rejoignant l'autre en s'arrondissant avant l'extrémité, formant ainsi une espèce de lyre, mais ne commençant pas à l'écusson; le corselet paraît plus large, à peine débordé par les élytres, lisse, les angles postérieurs bien marqués; les élytres sont plus arrondies, moins convexes, non rétuses en avant, à ponctuation plus fine, régulière; près de la suture, la partie foliacée est plus finement ponctuée.

Cassida dorsomicans. — Long. 5 mill. — *Orbicularis marginibus oblique deplanatis, rufescens, vix nitidula, plaga magna dorsali virescenti-micans, plagulis obscuris sparsa et extus linea lævi flava limitata; antennis prothoracis basin haud superantibus, apice paulo crassioribus, articulis 2 ultimis piceis; prothorace obsolete rugosulo, margine postico medio truncato-lobato et linea elevata transversim separato; angulis posticis rotundatis; scutello brevi, rufo; elytris dorso sat fortiter irregulariter punctatis, impressionibus obscuris sparsutis, sutura rufescente, post scutellum leviter retusis, non plicatis, utrinque fortiter striata, parte explanata paulo grossius punctata, ad humeros rotundato-angulosa et prothorace parum latiora, basi linea lævi a dorso separata; subtus cum pedibus rufa.* — Madagascar; ma collection.

Cette Casside est remarquable par la coloration de la partie dorsale des élytres qui est d'un verdâtre clair, changeant suivant la position, avec des impressions peu profondes, un peu obscures; elle se rapproche de la *latecincta*, mais la coloration est bien différente, le corselet n'a pas de tache dorsale et les élytres ne sont pas rugueuses, mais densément ponctuées; la forme est plus arrondie.

Cassida nigroscutata. — Long. 5 mill. — *Subrotunda, sat convexa, tota dilute lutoso-flavida, vix nitidula, elytris sæpius dilute virescentibus, macula impressa circumscutellari fusca; prothorace brevi, elytris parum angustiore, lateribus rotundato, subtiliter punctato-strigosulo, medio levioere, margine antico medio fere recto, postico medio vix truncato-lobato; scutello triangulari; elytris latis, lateribus sat late marginatis, basi oblique paulo retusis, fortiter rugosulo-punctatis, ad scutellum impressis et plicatis,*

parte dilatata postice intus punctis grossis plurimis lineatim impressa. — Ankarabitra (*H. Perrier*).

Remarquable par sa forme arrondie, la forte ponctuation des élytres et la tache brune circascutellaire.

Cassida breviscula. — Long. 3 1/2 à 4 mill. — Subrotundata, sat convexa, dilute fulvo-flavescens, interdum elytris dilute virescentibus; prothorace antice medio fere angulatim rotundato et magis convexo, dorso lævi, ad latera subtiliter punctato, lateribus et angulis posticis rotundato, margine postico medio breviter truncato-lobato, utrinque obliquo; scutello triangulari, lævi; elytris brevibus, fortiter substriato-punctatis, lineis basalibus prope scutellum obliquis et intervallis paulo convexis, puncto humerali piceo, ante apicem prope suturam interdum fusculo maculoso, parte explanata valde obliqua subtilius dense punctata, linea fortiter punctata intus limitata; antennis breviusculis, apice fere fusco-clavatis. — Soalala (*H. Perrier*).

Ressemble à la *C. inconstans* Fairm., mais d'une coloration plus claire, sans bande latérale plus ou moins foncée sur les élytres; celles-ci sont un peu plus atténuées en arrière, moins fortement ponctuées, plus unies, le corselet un peu anguleusement arrondi en avant, rarement un point brun derrière l'écusson et aux épaules; les bords du corselet et les élytres sont bien plus étroitement marginés.

Cassida fallaciosa. — Long. 5 1/2 à 6 mill. — Subrotundata, sat convexa, lateribus modice sed oblique deplanatis, rufescens, nitida, prothorace dorso interdum infusato, elytris maculis nigris, plus minusve confluentibus, sat minutis, ornatis; prothorace brevi, antice late arcuato, antice laxo punctulato, et utrinque obsolete impresso, dorso lævi, angulis posticis rectis, margine postico medio breviter lobato-truncato; scutello triangulari; elytris sublineato-punctatis, punctis sat grossis, parum regularibus, intervallis planis, parte explanata minus fortiter punctata, antice intus sat fortiter impressa, stria suturali sat impressa. — Plateau de l'Androy, Ambovombo (*D^r Decorse*); ma collection.

Ressemble beaucoup à certaines *Coptocycla* par sa forme presque arrondie, médiocrement convexe, et ses élytres assez fortement marginées, non rétuses à la base, mais les antennes sont courtes, atteignant à peine la base du corselet.

Cassida nigrotecta. — Long. 6 mill. — Ressemble extrêmement à la *fallaciosa* pour la forme et la coloration, mais plus fortement arrondie, plus tachetée sur les élytres, le corselet très arrondi

sur les côtés avec les angles postérieurs et ayant deux points noirs sur le disque; les élytres ont une teinte un peu dorée sur le dos, les points enfoncés sont un peu plus gros, moins nombreux, et les taches noires, moins nombreuses, sont plus grandes; enfin, le bord antérieur du corselet est presque droit au milieu. — Ankarahitra (*H. Perrier*); un seul individu.

Sans la forme arrondie des côtés du corselet, il serait difficile de séparer cette espèce de la précédente, mais les élytres sont en outre plus arrondies, avec une ponctuation plus forte, moins serrée et des taches noires plus grandes, moins nombreuses, moins confluentes.

Cassida funebris. — Long. 4 1/2 mill. — Sat breviter ovata, lateribus vix rotundata, sat convexa, fusco-nigra, vix nitidula, prothoracis margine antico breviter pallido-fulvido, subtus cum pedibus flavido-rufescens; prothorace brevi, transverso, elytris angustiore, subtiliter punctulato-rugosulo, utrinque late impresso, lateribus rotundato, parte antica fulvida, fere lævi; elytris convexis, lateribus haud marginatis, prothorace paulo latioribus, humeris angulatis, dorso fortiter plicatis et impressis, rugosulo-punctatis, plicis basi et medio parce rufo maculatis, postice valde declivibus, apice rotundatis. — Ankarahitra (*H. Perrier*).

Ressemble à l'*atrata* Fab., de la Russie méridionale, pour la forme et la coloration, mais plus étroite, avec les élytres plus longues, nullement marginées et le corselet avec une bande antérieure pâle au lieu de deux taches rougeâtres; les rugosités des élytres sont plus étroites, plus transversales, avec des impressions plus larges.

Cassida nigroguttata. — Long. 6 mill. — Ovata, sat convexa, rufa, nitida, maculis nigris numerosis ornata, prothorace 4, 2 anticis minutis, 2 medio baseos majoribus, elytris utrinque 5, basali, humerali, discoidali oblonga, post medium prope suturam et marginali ante apicem, 3 communibus, 1^a oblonga post scutellum, 2^a ante apicem, 3^a apicali minuta; antennis gracilibus, apice infuscatis, articulo ultimo acuto; prothorace brevi, antice late parum arcuatum, lævi, antice sat fortiter arcuatim et ad angulos posticos impresso, his obtusiusculis, margine postico utrinque valde obliquo, medio sat breviter lobato-truncato; scutello rufo; elytris sat latis, sat rotundatis, lateribus modice explanatis, dorso sat fortiter substriato-punctatis, intervallis parum regulariter convexis, parte explanato multo subtilius punctata, medio dilutiore. — Diégo-Suarez; ma collection.

Remarquable par sa coloration de taches noires bien nettes; la partie foliacée des élytres est médiocrement large.

Coptocycla piceidorsis. — Long. 5 mill. — Orbicularis, marginibus late explanatis, subtiliter reticulatis; dorso convexo flavicans, nitida, marginibus dilutioribus, plaga magna elytrorum dorsali fusca, extus medio emarginata et tuberosa; antennis gracilibus, medium elytrorum superantibus; prothorace postice paulo impressiusculo, angulis posticis rectis; scutello fusco, medio flavido; elytris latis, prothorace basi vix latioribus; elytris dorso convexis, pone scutellum leviter elevatis, basi sat lævibus, impressiusculis, postice paulo punctatis et rugosulis; subtus cum pedibus concolor. — Soalala (*H. Perrier*); un seul individu.

Ressemble beaucoup à la *Cassida latecincta* pour le facies et la coloration mais plus ronde; le corselet sans tache dorsale, les élytres plus unies, nullement rétuses derrière l'écusson, avec la grande tache dorsale fortement échancrée en dehors et les antennes très longues, concolores, tandis qu'elles dépassent à peine la base du corselet, s'épaississant un peu et rembrunies vers l'extrémité chez la *latecincta*.

Coptocycla trizonata. — Long. 4 1/2 mill. — Brevissime ovata, fere orbicularis, dilute flavida, nitida, prothorace basi breviter nigro-bistrigato, elytris vitta suturali integra et utrinque vitta discoidali postice abbreviata nigris; prothorace antice arcuato, margine antico translucido, ad caput interrupto, angulis posticis fere rotundatis, margine postico medio lobato-producto, scutello triangulari; elytris brevibus, ad humeros angulatis et prothoracem paulo superantibus, dorso punctulato-lineatis, punctis post medium oblitteratis, basi interdum punctulo nigro signata, humeris lævibus, parte marginali paulo dilutiore, punctulata et intus stria paulo arcuata limitata; subtus cum pedibus magis rufa, antennis flavescens, apice nigris. — Soalala (*H. Perrier*).

Ressemble à *C. trivittata* Fab., mais plus petite, nullement verdâtre avec la moitié apicale des antennes noire et les élytres à lignes ponctuées.
